

## [Леворин \(мазь\)](#)



### **Код АТХ:**

- [A07AX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Леворин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Полиеновый противогрибковый антибиотик. Благодаря большому числу сопряженных двойных связей обладает высокой тропностью к стероловым образованиям клеточной мембраны грибов. Связываясь с ними, индуцируя проницаемость мембраны, приводит к лизису клетки. Наибольшую активность проявляет в отношении *Candida albicans* и некоторых простейших (амебы, лейшмании, трихомонады).

#### **Фармакокинетика**

Практически не всасывается из ЖКТ и полностью выводится с калом.

### **Показания к применению:**

Внутрь: кандидоз ЖКТ, кандидоносительство.

Местно: кандидоз слизистой оболочки полости рта; кандидоз половых органов у женщин (вульвовагинит, уретрит, цистит).

Наружно: паронихии, межпальцевые эрозии, поражения складок кожи.

### **Относится к болезням:**

- [Вульвит](#)
- [Уретрит](#)
- [Цистит](#)

### **Противопоказания:**

Печеночная и/или почечная недостаточность, острые негрибковые заболевания кишечника, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит; беременность.

Для интравагинального применения: менструальный период, метроррагия, беременность.

Повышенная чувствительность к активному веществу.

### **Способ применения и дозы:**

Доза зависит от показаний, применяемой лекарственной формы, возраста пациента.

### **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* при приеме внутрь - ухудшение аппетита, тошнота, рвота, диарея.

*Прочие:* головная боль, местнораздражающее действие, аллергические реакции.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности.

С осторожностью применять в период лактации.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применять у детей в возрасте до 2 лет.

При гипертрофии предстательной железы леворин уменьшает дизурические явления, а в некоторых случаях и размеры аденомы. Считается, что возможно применение леворина в составе комплексной терапии при гипертрофии предстательной железы.

#### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при почечной недостаточности.

#### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при печеночной недостаточности.

#### ***Применение в детском возрасте***

С осторожностью применять у детей в возрасте до 2 лет.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Levorin\\_maz](http://drugs.thead.ru/Levorin_maz)