Левосин



Код АТХ:

- D06C

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Диоксометилтетрагидропиримидин
- Сульфадиметоксин
- Тримекаин
- Хлорамфеникол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения 40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Мазь для наружного применения 50, 100 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

Мазь для наружного применения 1000 г - банки темного стекла (1) - бумага оберточная.

Состав:

1 г мази для наружного применения содержит

Активные вещества: хлорамфеникол 10 мг, сульфадиметоксин 40 мг, метилурацил 40 мг, тримекаин 30 мг.

Описание:

Мазь для наружного применения почти белого с желтоватым оттенком цвета, полупрозрачная, однородная, гомогенная.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антибактериальное, противовоспалительное, стимулирующее регенерацию и местноанестезирующее действие.

Хлорамфеникол оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамположительных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; грамотрицательных бактерий: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Yersinia spp., Proteus spp., Rickettsia spp.; также активен в отношении Spirochaetaceae.

Сульфадиметоксин оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, Escherichia coli, Shigella spp., Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae, Clostridium spp., Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, а также в отношении Chlamydia spp., Actinomyces spp., Toxoplasma gondii.

Метилурацил ускоряет процессы клеточной регенерации, оказывает противовоспалительное действие. Тримекаин - местный анестетик, действует более сильно и более продолжительно, чем новокаин, мало токсичен, не оказывает раздражающего действия.

Водорастворимая основа мази - полиэтиленгликоль - усиливает и пролонгирует ее антибактериальное действие. Мазь легко проникает вглубь тканей без повреждения биологических мембран.

На фоне применения препарата происходит уменьшение перифокального отека и очищение раны от гнойно-некротического содержимого в течение 2-3 дней.

Фармакокинетика

Мазь легко проникает вглубь тканей без повреждения биологических мембран.

Показания к применению:

Инфицированные кожные раны различной этиологии (ожоги, раны, трудно заживающие язвы) в I фазе раневого процесса.

Относится к болезням:

- Варикозные язвы
- Ожоги
- Раны

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которые накладывают на рану или рыхло ее заполняют после стандартной обработки (механическое удаление некротических тканей, промывание раствором перекиси водорода).

Возможно введение препарата в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В таких случаях Левосин предварительно подогревают до 35-36°С. Перевязки проводят ежедневно до полного очищения раны.

Побочное действие:

Аллергические реакции в виде кожных высыпаний, при появлении которых применение препарата необходимо прекратить.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение в период беременности и лактации возможно только после тщательной оценки возможного риска для плода или ребёнка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не кумулирует и не оказывает местнораздражающее действие. Не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше +20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Levosin