

## Левулоза



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Фруктоза](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Парентеральное средство для регидратации и дезинтоксикации.

### **Показания к применению:**

Дегидратация, острая алкогольная интоксикация (в составе комбинированной терапии), неукротимая рвота беременных, в качестве заменителя глюкозы при сахарном диабете, дефицит углеводного питания в до- и послеоперационный периоды, парентеральное питание.

### **Относится к болезням:**

- [Интоксикация](#)
- [Рвота](#)
- [Сахарный диабет](#)

### **Противопоказания:**

Избыточная гидратация организма, отравление метиловым спиртом, декомпенсированная форма сахарного диабета, повышенная чувствительность к фруктозе.

### **Способ применения и дозы:**

Вводят в/в капельно. Доза зависит от применяемой лекарственной формы и возраста пациента.

### **Побочное действие:**

Лактацидоз, гиперурикемия, повышенная чувствительность к фруктозе.

**Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применяют у пациентов с выраженными нарушениями функции печени и почек.

Имеются клинические данные о применении фруктозы при неукротимой рвоте беременных. В небольших количествах (до 25 мг/сут) фруктозу применяют как заменитель сахара при диабете.

***При нарушениях функции почек***

С осторожностью применяют у пациентов с выраженными нарушениями функции почек.

***При нарушениях функции печени***

С осторожностью применяют у пациентов с выраженными нарушениями функции печени.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Levuloza>