

[Левзеи экстракт жидкий](#)



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Левзеи сафлоровидной корневища с корнями](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения, оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие. Способствует накоплению гликогена и АТФ в скелетных мышцах, печени и сердце, снижает концентрацию глюкозы при адреналиновой гипергликемии и препятствует развитию гипогликемии при введении инсулина. Обладает гиполлипидемическим и антигипоксическим свойствами, повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, к физическим нагрузкам. Повышает умственную работоспособность, снижает утомляемость, улучшает память, потенцию, повышает способность к концентрации внимания.

Показания к применению:

В составе комбинированной терапии: астения, физическое и умственное переутомление, снижение потенции, период реконвалесценции.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Реконвалесценция](#)

Противопоказания:

Артериальная гипертензия, аритмии, острый период инфекционных заболеваний, повышенная нервная

возбудимость, эпилепсия, нарушения сна, хронические заболевания печени и почек, хронический алкоголизм (для лекарственных форм, содержащих этанол), беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет), повышенная чувствительность к растительному средству.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь. Капли и экстракт для приема внутрь: по 20-30 кап. 2-3 раза/сут, во время еды. Сырье растительное (брикеты): 1 г сырья (2 брикета) заливают 200 мл воды, нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают и доводят объем до 200 мл. Настой принимают по 100 мл до еды утром и днем. Курс лечения - 2-3 нед.

Побочное действие:

Возможно: повышение АД, головная боль, раздражительность, бессонница, диспепсия; аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Во избежание нарушения сна не следует применять во второй половине дня, позднее чем за 3-4 ч до сна.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронических заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при хронических заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Levzei_ekstrakt_zhidkiy