# Левзеи экстракт жидкий



## Код АТХ:

- A13A

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Левзеи сафлоровидной корневища с корнями

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Средство растительного происхождения, оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие. Способствует накоплению гликогена и АТФ в скелетных мышцах, печени и сердце, снижает концентрацию глюкозы при адреналиновой гипергликемии и препятствует развитию гипогликемии при введении инсулина. Обладает гиполипидемическим и антигипоксическим свойствами, повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, к физическим нагрузкам. Повышает умственную работоспособность, снижает утомляемость, улучшает память, потенцию, повышает способность к концентрации внимания.

## Показания к применению:

В составе комбинированной терапии: астения, физическое и умственное переутомление, снижение потенции, период реконвалесценции.

## Относится к болезням:

- Астения
- Реконвалесценция

## Противопоказания:

Артериальная гипертензия, аритмии, острый период инфекционных заболеваний, повышенная нервная

возбудимость, эпилепсия, нарушения сна, хронические заболевания печени и почек, хронический алкоголизм (для лекарственных форм, содержащих этанол), беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет), повышенная чувствительность к растительному средству.

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь. Капли и экстракт для приема внутрь: по 20-30 кап. 2-3 раза/сут, во время еды. Сырье растительное (брикеты): 1 г сырья (2 брикета) заливают 200 мл воды, нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают и доводят объем до 200 мл. Настой принимают по 100 мл до еды утром и днем. Курс лечения - 2-3 нед.

## Побочное действие:

*Возможно:* повышение АД, головная боль, раздражительность, бессонница, диспепсия; аллергические реакции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

## Особые указания и меры предосторожности:

Во избежание нарушения сна не следует применять во второй половине дня, позднее чем за 3-4 ч до сна.

***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при хронических заболеваниях почек.

***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при хронических заболеваниях печени.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Levzei_ekstrakt_zhidkiy