

Лидент Бэби



Код АТХ:

- [A01AD11](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лидокаин](#)
- [Цетилпиридиния хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

Гель стоматологический, 0,33% + 0,1%. По 5 или 10 г в тубе алюминиевой. Каждую тубу помещают в пачку из картона.

Состав:

Гель стоматологический	1 г
<i>активные вещества:</i>	
лидокаина гидрохлорид	3,3 мг
(в пересчете на 100% безводное вещество)	
цетилпиридиния хлорид	1 мг
(в пересчете на 100% безводное вещество)	

вспомогательные вещества: сорбитол жидкий некристаллизующийся; ксилитол; спирт этиловый 96%; глицерол; гиэтеллоза (гидроксиэтилцеллюлоза); макрогола глицерилгидроксистеарат (макрогола 40 глицерилгидроксистеарат); лауромакрогол 600 (макрогола лауриловый эфир); макрогол 300; натрия сахаринат; левоментол; ароматизатор ромашки; карамель E150a; натрия цитрат; лимонная кислота; вода очищенная

Описание:

Гель от светло-желтого до желтого с коричневатым оттенком цвета. Допускается наличие слабого характерного запаха.

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антисептическое, местноанестезирующее.

Фармакодинамика

Механизм действия. Препарат Лидент Бэби является обезболивающим средством, применяемым для нанесения на слизистую оболочку полости рта. Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие при нанесении на слизистую оболочку. Цетилпиридиния хлорид обладает антисептическими свойствами.

Фармакокинетика

Цетилпиридиния хлорид практически не всасывается через слизистую оболочку полости рта.

Лидокаина гидрохлорид слабо всасывается через слизистую оболочку ротовой полости. При приеме внутрь абсорбируется, подвергаясь метаболизму при "первом прохождении" через печень. При приеме внутрь его биодоступность составляет около 35%. Метаболиты выводятся вместе с мочой, менее 10% вещества выводятся в неизменном виде.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки: фарингит; ларингит; катаральная ангина; стоматит; язвенный гингивит; тонзиллит (в качестве вспомогательного средства).

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)
- [Язвенный гингивит](#)

Противопоказания:

I триместр беременности; период грудного вскармливания; детский возраст до 6 лет (для лекарственных форм, предназначенных для детей старше 6 лет и взрослых), повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

С осторожностью

Открытые раны слизистой оболочки полости рта.

Способ применения и дозы:

Применяют местно, в зависимости от лекарственной формы - для рассасывания или обработки полости рта каждые 3-4 ч, по мере необходимости.

Побочное действие:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Передозировка:

Симптомы: в результате чрезмерного применения препарата Лидент Бэби может наблюдаться снижение фарингеальной чувствительности с сопутствующим влиянием на глотание. Такой эффект был зарегистрирован у взрослого человека, который при полоскании горла проглотил 5 мл 2% раствора лидокаина гидрохлорида (что эквивалентно 100 мг лидокаина). Если соотнести площадь поверхности тела к площади поверхности глотки ребенка в возрасте 3 мес, эта доза будет эквивалентна 5,4 г препарата Лидент Бэби. Даже при неправильном или чрезмерном применении препарата Лидент Бэби маловероятно достижение тех больших количеств лидокаина гидрохлорида или цетилпиридиния хлорида, которые могли бы вызвать клинически значимые токсические эффекты.

Лечение: необходимо прекратить применение препарата Лидент Бэби и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение в I триместре беременности. Применение во II-III триместрах беременности возможно под наблюдением врача, в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Не рекомендуется применять в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных о взаимодействии препарата Лидент Бэби с другими препаратами.

В случае необходимости применения других препаратов следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует принимать непосредственно перед приемом пищи и одновременно с молоком. Одновременный прием с молоком и пищей может снизить местные антисептический и анестезирующий эффекты.

Алкоголь повышает абсорбцию цетилпиридиния хлорида, поэтому в период лечения не следует употреблять алкоголь.

Цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lident_Bebi