# Лидокаин (капли)

## Код АТХ:

- N01BB02

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Капли глазные 2%*** прозрачные, бесцветные или слегка окрашенные.

| | **1 мл** |
|---|---|
| лидокаина гидрохлорид | 20 мг |

*Вспомогательные вещества:* бензетония хлорид, натрия хлорид, вода д/и.

5 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Местноанестезирующее действие обусловлено блокадой вольтажзависимых Na+-каналов, что препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению болевых импульсов по нервным волокнам.

После инсталляции в конъюнктивальный мешок местноанестезирующее действие достигается через 2-3 мин и продолжается не менее 6-8 мин.

## Показания к применению:

Местная анестезия в офтальмологии:

— при проведении контактных методов исследования (тонометрия, гониоскопия, диагностический соскоб роговицы);

— кратковременных оперативных вмешательств на роговице и конъюнктиве (в т.ч. извлечение инородного тела и шовного материала);

— подготовка к офтальмологическим операциям.

## Относится к болезням:

- Анестезия
- Конъюнктивит

## Противопоказания:

— гиперчувствительность.

## Способ применения и дозы:

Местно, путем инсталляции в конъюнктивальный мешок непосредственно перед исследованием или оперативным вмешательством, по 1-2 кап. 2-3 раза с интервалом 30-60 с.

## Побочное действие:

Местные аллергические реакции, раздражение конъюнктивы, при длительном применении - эпителиопатия роговицы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять препарат при беременности и в период лактации.

## Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат у детей, при беременности и в период лактации.

***Применение в детском возрасте***

С осторожностью следует применять препарат у детей.

## Условия хранения:

Список Б. Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Lidokain_kapli