Лидокаин (капли)



Код АТХ:

- N01BB02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные 2% прозрачные, бесцветные или слегка окрашенные.

	1 мл
лидокаина гидрохлорид	20 мг

Вспомогательные вещества: бензетония хлорид, натрия хлорид, вода д/и.

5 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Местноанестезирующее действие обусловлено блокадой вольтажзависимых Na+-каналов, что препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению болевых импульсов по нервным волокнам.

После инсталляции в конъюнктивальный мешок местноанестезирующее действие достигается через 2-3 мин и продолжается не менее 6-8 мин.

Показания к применению:

Местная анестезия в офтальмологии:

— при проведении контактных методов исследования (тонометрия, гониоскопия, диагностический соскоб роговицы);

— кратковременных оперативных вмешательств на роговице и конъюнктиве (в т.ч. извлечение инородного тела и шовного материала);

— подготовка к офтальмологическим операциям.

Относится к болезням:

- Анестезия
- Конъюнктивит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно, путем инсталляции в конъюнктивальный мешок непосредственно перед исследованием или оперативным вмешательством, по 1-2 кап. 2-3 раза с интервалом 30-60 с.

Побочное действие:

Местные аллергические реакции, раздражение конъюнктивы, при длительном применении - эпителиопатия роговицы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять препарат при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат у детей, при беременности и в период лактации.

Применение в детском возрасте

С осторожностью следует применять препарат у детей.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lidokain_kapli