Ликопид



Код АТХ:

- L03A

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Глюкозаминилмурамилдипептид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской.

	1 таб.
ГМДП (глюкозаминилмурамилдипептид)	1 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, сахароза, крахмал картофельный, метилцеллюлоза, кальция стеарат.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

	1 таб.
ГМДП (глюкозаминилмурамилдипептид)	10 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, сахароза, крахмал картофельный, метилцеллюлоза, кальция стеарат.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующий препарат, биологическая активность которого обусловлена наличием специфических центров связывания (рецепторов) к ГМДП, локализованных в эндоплазме фагоцитов и Т-лимфоцитов.

Препарат стимулирует функциональную (бактерицидную, цитотоксическую) активность фагоцитов (нейтрофилов, макрофагов), усиливает пролиферацию Т- и В- лимфоцитов, повышает синтез специфических антител.

Фармакологическое действие осуществляется посредством усиления выработки интерлейкинов (интерлейкина-1, интерлейкина-6, интерлейкина-12), фактора некроза опухолей -альфа, гамма-интерферона, колониестимулирующих факторов.

Препарат повышает активность естественных киллерных клеток.

Фармакокинетика

Всасывание и распределение

C_{max} активного вещества в плазме достигается через 1.5 ч после приема. Биодоступность при пероральном приеме составляет 7-13%.

Степень связывания с альбуминами крови слабая.

Метаболизм и выведение

Активных метаболитов не образует.

$T_{1/2}$ составляет 4.29 ч. Выводится в неизмененном виде, преимущественно с мочой.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии состояний, сопровождающихся вторичными иммунодефицитами, в т.ч.:

Таблетки 1 мг и 10 мг (для взрослых)

— при хронических инфекциях легких;

— при острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей (в т.ч. гнойно-септических послеоперационных осложнениях);

— при герпетической инфекции (в т.ч. при офтальмогерпесе);

— при папилломавирусной инфекции;

— при хронических вирусных гепатитах В и С;

— при псориазе (в т.ч. при артропатической форме);

— при туберкулезе легких.

Таблетки 1 мг (для детей)

— при острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей;

— при хронических инфекциях верхних и нижних отделов дыхательных путей, как в стадии обострения, так и в стадии ремиссии;

— при герпетической инфекции любой локализации;

— при хронических вирусных гепатитах В и С.

Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз
- Гепатит
- Гепатоз

- Герпес
- Инфекции
- Папиллит
- Псориаз
- Туберкулез

Противопоказания:

— аутоиммунный тиреоидит в фазе обострения;

— заболевания, сопровождающиеся высокой лихорадкой или гипертермией (>38°С);

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Липопид назначают сублингвально или внутрь натощак, за 30 мин до еды.

Взрослым для *профилактики послеоперационных осложнений* Липопид назначают сублингвально по 1 мг 1 раз/сут в течение 10 дней.

Для *лечения гнойно-септических процессов кожи и мягких тканей средней тяжести (в т.ч. послеоперационных)* Липопид назначают сублингвально по 2 мг 2-3 раза/сут в течение 10 дней.

Для *лечения тяжелых форм гнойно-септических процессов кожи и мягких тканей* Липопид назначают внутрь по 10 мг 1 раз/сут в течение 10 дней.

При *хронических инфекциях верхних и нижних отделов дыхательных путей* Липопид назначают сублингвально по 1-2 мг 1 раз/сут в течение 10 дней.

При *туберкулезе легких* Липопид назначают внутрь по 10 мг 1 раз/сут в течение 10 дней.

При *легкой форме герпетической инфекции* Липопид назначают сублингвально по 2 мг 1-2 раза/сут в течение 6 дней; при *тяжелой форме* - сублингвально по 10 мг 1-2 раза/сут в течение 6 дней. При *офтальмогерпесе* Липопид применяют внутрь по 10 мг 2 раза/сут в течение 3 дней. После перерыва в 3 дня курс лечения повторяют.

При *поражении шейки матки вирусом папилломы человека* Липопид назначают внутрь по 10 мг 1 раз/сут в течение 10 дней.

Для *лечения псориаза* Липопид назначают внутрь в дозе 10-20 мг 1-2 раза/сут в течение 10 дней и далее через день по 10-20 мг в течение следующих 10 дней, при *тяжелых формах и большой площади поражения* (*в т.ч. при артропатической форме*) - внутрь 10 мг 2 раза/сут в течение 20 дней.

Детям в возрасте от 1 года до 16 лет Липопид назначают в форме таблеток 1 мг.

При *лечении хронических инфекций дыхательных путей и гнойно-воспалительных заболеваний кожи* Липопид назначают внутрь в дозе 1 мг 1 раз/сут в течение 10 дней.

При *лечении герпетической инфекции* препарат назначают внутрь в дозе 1 мг 3 раза/сут в течение 10 дней.

При *лечении хронических вирусных гепатитов В и С* - внутрь в дозе 1 мг 3 раза/сут в течение 20 дней.

Новорожденным при *затяжном течении инфекционных заболеваний (в т.ч. пневмонии, бронхиты, энтероколиты, сепсис, послеоперационные осложнения)* Липопид назначают внутрь в дозе 500 мкг 2 раза/сут в течение 7-10 дней.

Побочное действие:

Возможно: в начале лечения - повышение температуры тела до 37.9°С (является кратковременным, проходит самостоятельно и не требует отмены препарата).

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ликопид не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) противопоказано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Ликопид повышает действие антибиотиков из группы полусинтетических пенициллинов, цефалоспоринов, полиеновых производных, фторхинолонов, отмечается синергизм в отношении противовирусных и противогрибковых препаратов.

Антациды и адсорбенты при одновременном применении с Ликопидом значительно снижают его биодоступность.

ГКС при одновременном применении снижают эффективность Ликопида.

Особые указания и меры предосторожности:

Нецелесообразно совместное назначение Ликопида с сульфаниламидными препаратами и тетрациклинами.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата Ликопид не оказывает влияния на способность к выполнению работы, требующей повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте от 1 года до 16 лет Ликопид назначают в форме таблеток 1 мг.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Likopid