

Лимонника семян настойка



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лимонника китайского семена](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения, оказывает общетонизирующее и психостимулирующее действие. Усиливает процессы возбуждения в структурах головного мозга и рефлекторную деятельность; повышает работоспособность и уменьшает утомление при физических и умственных нагрузках.

Показания к применению:

Астения, реконвалесценция (после соматических и инфекционных заболеваний); деятельность, сопряженная с большими нервно-психическими и физическими нагрузками; снижение работоспособности; нарушение половой функции на фоне неврастении (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Инфекции](#)
- [Неврит](#)
- [Реконвалесценция](#)

Противопоказания:

Артериальная гипертензия, повышенная возбудимость, эпилепсия, бессонница, острые инфекционные и вирусные

заболевания, печеночная недостаточность, беременность, лактация, детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к растительному средству.

Способ применения и дозы:

принимают внутрь 3 раза/сут, за 10-15 мин до еды. Курс лечения - 2 нед; при необходимости повторяют через 1-2 нед.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, тахикардия, бессонница, головная боль.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в т.ч. кофеина, камфоры, фенамина).

Является физиологическим антагонистом снотворного действия лекарственных средств, угнетающих ЦНС (в т.ч. барбитуратов, транквилизаторов, противозипилептических, седативных средств, нейролептиков).

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует принимать во второй половине дня (во избежание нарушения засыпания).

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить применение.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Limonnika_semyan_nastoyka