

## Лимонника семян настойка



### **Код АТХ:**

- [A13A](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Лимонника китайского семена](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Нейротропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство растительного происхождения, оказывает общетонизирующее и психостимулирующее действие. Усиливает процессы возбуждения в структурах головного мозга и рефлекторную деятельность; повышает работоспособность и уменьшает утомление при физических и умственных нагрузках.

### **Показания к применению:**

Астения, реконвалесценция (после соматических и инфекционных заболеваний); деятельность, сопряженная с большими нервно-психическими и физическими нагрузками; снижение работоспособности; нарушение половой функции на фоне неврастении (в составе комплексной терапии).

### **Относится к болезням:**

- [Астения](#)
- [Инфекции](#)
- [Неврит](#)
- [Реконвалесценция](#)

### **Противопоказания:**

Артериальная гипертензия, повышенная возбудимость, эпилепсия, бессонница, острые инфекционные и вирусные

заболевания, печеночная недостаточность, беременность, лактация, детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к растительному средству.

### **Способ применения и дозы:**

принимают внутрь 3 раза/сут, за 10-15 мин до еды. Курс лечения - 2 нед; при необходимости повторяют через 1-2 нед.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции, тахикардия, бессонница, головная боль.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности, лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в т.ч. кофеина, камфоры, фенамина).

Является физиологическим антагонистом снотворного действия лекарственных средств, угнетающих ЦНС (в т.ч. барбитуратов, транквилизаторов, противозипилептических, седативных средств, нейролептиков).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Не следует принимать во второй половине дня (во избежание нарушения засыпания).

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить применение.

#### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при печеночной недостаточности.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Limonnika\\_semyan\\_nastoyka](http://drugs.thead.ru/Limonnika_semyan_nastoyka)