Лимонтар

Код АТХ:

- A15

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лимонная кислота
- Янтарная кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки растворимые*** таблетки белого цвета с элементами мраморности, двояковыпуклой формы.

	1 таб.
лимонной кислоты моногидрат	50 мг
янтарная кислота	200 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат 3 мг.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Разные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Метаболический препарат. Лимонтар является регулятором тканевого обмена, усиливает окислительно-восстановительные процессы, образование АТФ, чем обусловлены его антигипоксические и антиоксидантные свойства, и способность препарата:

— активировать функции органов и тканей,

— повышать реактивность организма,

— повышать умственную и физическую работоспособность,

— улучшать течение беременности, рост и развитие плода, ·

— усиливать секрецию желудочного сока, образование соляной кислоты, повышать аппетит,

— уменьшать токсическое действие алкоголя.

Действие препарата Лимонтар проявляется через 10-20 мин после приема внутрь

Фармакокинетика

Янтарная и лимонная кислоты полностью разлагаются до воды и углекислого газа, накопления в организме не происходит.

Показания к применению:

Лимонтар применяют:

— в качестве средства для повышения неспецифической реактивности организма беременных женщин, улучшения его адаптационных и компенсаторно-защитных возможностей в целях профилактики осложнений при гипоксии, гипотрофии плода, при невынашивании беременности;

— для профилактики опьянения;

— при лечении острого алкогольного опьянения легкой и средней степени тяжести для уменьшения токсического влияния алкоголя и постинтоксикационных расстройств;

— в комплексной терапии для лечения запойных состояний у больных с хроническим алкоголизмом;

— в период алкогольного абстинентного синдрома для комплексного лечения астеновегетативных расстройств (общая слабость, снижение работоспособности, аппетита);

— в качестве "пробного завтрака" при исследовании секреторной и кислотообразующей функции желудка (диагностическая значимость лекарственного препарата Лимонтар и гистамина равноценна).

Относится к болезням:

- Астения

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— артериальная гипертензия;

— ИБС (в т.ч. стенокардия);

— глаукома;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;

— поздний гестоз (тяжелая форма).

Способ применения и дозы:

Применяют внутрь до еды. Перед приемом таблетку измельчают и растворяют в воде с питьевой содой (сода - на кончике ножа). Для растворения можно использовать минеральную воду.

Беременным Лимонтар назначают по 1 таб./сут в течение 10 дней в *I триместре (на сроке беременности 12-14 недель)* и во *II триместре (срок беременности 24-26 недель)*. В *III триместре* назначают за 10-25 дней до родов. Общая доза препарата Лимонтарза период беременности 5-7.5 г.

В *качестве средства для профилактики опьянения* – 1 таб. препарата Лимонтар за 20-60 мин до приема алкоголя.

В *состоянии острого алкогольного опьянения* препарат назначают по 1 таб. 2-4 раза/сут с интервалом в 1-2.5 ч.

При *купировании запойных состояний* Лимонтар назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут в течение 4-10 дней, как самостоятельно, так и в комплексе с традиционными лекарственными средствами.

При *назначении в качестве* "*пробного завтрака*" *для исследования секреторной и кислотообразующей функции желудка* принимают внутрь, натощак 1 таб., предварительно растворив в 10-15 мл воды.

При появлении чувства тяжести в подложечной области Лимонтар назначают после еды.

Побочное действие:

Возможно появление болей в подложечной области (обычно эти явления проходят самостоятельно через 3-5 мин), повышенная секреция желудочного сока. У лиц, склонных к повышению АД, после приема препарата может повышаться АД.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности возможно применение по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Ослабляет действие снотворных лекарственных средств, транквилизаторов.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности **-** 3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Limontar