

Лимонтар



Код АТХ:

- [A15](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лимонная кислота](#)
- [Янтарная кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки растворимые** таблетки белого цвета с элементами мраморности, двояковыпуклой формы.

	1 таб.
лимонной кислоты моногидрат	50 мг
янтарная кислота	200 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат 3 мг.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Разные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Лимонтар

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Метаболический препарат. Лимонтар является регулятором тканевого обмена, усиливает окислительно-восстановительные процессы, образование АТФ, чем обусловлены его антигипоксические и антиоксидантные свойства, и способность препарата:

- активировать функции органов и тканей,
- повышать реактивность организма,
- повышать умственную и физическую работоспособность,
- улучшать течение беременности, рост и развитие плода,
- усиливать секрецию желудочного сока, образование соляной кислоты, повышать аппетит,
- уменьшать токсическое действие алкоголя.

Действие препарата Лимонтар проявляется через 10-20 мин после приема внутрь

Фармакокинетика

Янтарная и лимонная кислоты полностью разлагаются до воды и углекислого газа, накопления в организме не происходит.

Показания к применению:

Лимонтар применяют:

- в качестве средства для повышения неспецифической реактивности организма беременных женщин, улучшения его адаптационных и компенсаторно-защитных возможностей в целях профилактики осложнений при гипоксии, гипотрофии плода, при невынашивании беременности;
- для профилактики опьянения;
- при лечении острого алкогольного опьянения легкой и средней степени тяжести для уменьшения токсического влияния алкоголя и постинтоксикационных расстройств;
- в комплексной терапии для лечения запойных состояний у больных с хроническим алкоголизмом;
- в период алкогольного абстинентного синдрома для комплексного лечения астеновегетативных расстройств (общая слабость, снижение работоспособности, аппетита);
- в качестве "пробного завтрака" при исследовании секреторной и кислотообразующей функции желудка (диагностическая значимость лекарственного препарата Лимонтар и гистамина равноценна).

Относится к болезням:

- [Астения](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- артериальная гипертензия;
- ИБС (в т.ч. стенокардия);
- глаукома;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- поздний гестоз (тяжелая форма).

Способ применения и дозы:

Применяют внутрь до еды. Перед приемом таблетку измельчают и растворяют в воде с питьевой содой (сода - на кончике ножа). Для растворения можно использовать минеральную воду.

Лимонтар

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Беременным Лимонтар назначают по 1 таб./сут в течение 10 дней в I триместре (на сроке беременности 12-14 недель) и во II триместре (срок беременности 24-26 недель). В III триместре назначают за 10-25 дней до родов. Общая доза препарата Лимонтарза период беременности 5-7.5 г.

В качестве средства для профилактики опьянения – 1 таб. препарата Лимонтар за 20-60 мин до приема алкоголя.

В состоянии острого алкогольного опьянения препарат назначают по 1 таб. 2-4 раза/сут с интервалом в 1-2.5 ч.

При купировании запойных состояний Лимонтар назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут в течение 4-10 дней, как самостоятельно, так и в комплексе с традиционными лекарственными средствами.

При назначении в качестве "пробного завтрака" для исследования секреторной и кислотообразующей функции желудка принимают внутрь, натощак 1 таб., предварительно растворив в 10-15 мл воды.

При появлении чувства тяжести в подложечной области Лимонтар назначают после еды.

Побочное действие:

Возможно появление болей в подложечной области (обычно эти явления проходят самостоятельно через 3-5 мин), повышенная секреция желудочного сока. У лиц, склонных к повышению АД, после приема препарата может повышаться АД.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности возможно применение по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Ослабляет действие снотворных лекарственных средств, транквилизаторов.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Limontar>