Линекс



Код АТХ:

- A07FA51

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** непрозрачные, с белым корпусом и крышечкой; содержимое - порошок белого цвета, без запаха.

	1 капс.
Лебенин	280 мг

(в 1 г активного ингредиента Лебенин, порошка содержится: Lactobacillus acidophilus (species L.gasseri) - 300 мг, Bifidobacterium infantis - 300 мг, Enterococcus faecium - 300 мг, лактоза - 50 мг, крахмал картофельный - 50 мг)

Вспомогательные вещества: магния стеарат - 8.4 мг.

Состав оболочки капсулы: метилгидроксибензоат - 0.19 мг, пропилгидроксибензоат - 0.08 мг, титана диоксид (E171) - 0.98 мг, желатин - до 63 мг.

8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (4) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (5) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (6) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (7) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (8) - пачки картонные.
16 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой фольги/жесткой полимерной пленки (Al/PVC/PVDC) (1) - пачки картонные.
16 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
32 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, нормализующий микрофлору кишечника. Одна капсула препарата содержит не менее 1.2×10^7 живых лиофилизированных молочнокислых бактерий: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium. Живые молочнокислые бактерии являются нормальной составляющей естественной микрофлоры кишечника и содержатся уже в пищеварительном тракте новорожденного.

Входящие в состав Линекса бифидобактерии, лактобациллы и энтерококки вызывают сдвиг pH кишечника в кислую сторону за счет брожения лактозы, при этом кислая среда угнетает рост патогенных и условно-патогенных бактерий и обеспечивает оптимальное действие пищеварительных ферментов; участвуют в синтезе витаминов B, K, аскорбиновой кислоты, повышая тем самым резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды; участвуют в метаболизме желчных кислот и желчных пигментов; синтезируют вещества с антибактериальной активностью; повышают иммунную реактивность организма.

Фармакокинетика

В настоящее время отсутствуют фармакокинетические модели для исследования у человека сложных биологических веществ, состоящих из компонентов с различной молекулярной массой.

Показания к применению:

— лечение и профилактика дисбактериоза.

Дисбактериоз проявляется диареей, диспепсией, запором, метеоризмом, тошнотой, рвотой, отрыжкой, болями в животе; возможны аллергические реакции.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Диарея
- Дисбактериоз
- Диспепсия
- Запор
- Метеоризм
- Отрыжка
- Тошнота

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или к молочным продуктам.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь после приема пищи, капсулы следует запивать небольшим количеством воды. Детям в возрасте до 3 лет и пациентам, которые не могут проглотить капсулу, следует вскрыть ее, высыпать содержимое в ложку и смешать с небольшим количеством воды.

Новорожденным и детям в возрасте до 2 лет назначают по 1 капсуле 3 раза/сут.

Детям в возрасте от 2 до 12 лет - по 1-2 капсулы 3 раза/сут.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 капсулы 3 раза/сут.

Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.

Побочное действие:

Препарат хорошо переносится. Сведений о нежелательных реакциях нет, однако нельзя исключить возможность развития реакций повышенной чувствительности.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Линекс не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации считается безопасным.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не отмечено нежелательного взаимодействия Линекса с другими препаратами.

Состав препарата Линекс позволяет принимать его одновременно с антибиотиками и химиотерапевтическими средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется запивать Линекс горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем.

Пациент должен обратиться к врачу, если перед началом приема препарата у него отмечается температура тела выше 38°С, отмечается кровь или слизь в стуле, диарея продолжается более 2 дней и сопровождается острыми болями в животе, обезвоживанием и потерей массы тела, при наличии хронических заболеваний (СПИД, сахарный диабет).

При лечении диареи необходимо возмещение потерянной жидкости и электролитов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния.

Применение в детском возрасте

Применяется у детей по показаниям.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lineks