

## Линекс



### Код АТХ:

- [A07FA51](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капсулы** непрозрачные, с белым корпусом и крышечкой; содержимое - порошок белого цвета, без запаха.

	<b>1 капс.</b>
Лебенин	280 мг

(в 1 г активного ингредиента Лебенин, порошка содержится: *Lactobacillus acidophilus* (species *L.gasseri*) - 300 мг, *Bifidobacterium infantis* - 300 мг, *Enterococcus faecium* - 300 мг, лактоза - 50 мг, крахмал картофельный - 50 мг)

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат - 8.4 мг.

*Состав оболочки капсулы:* метилгидроксibenзоат - 0.19 мг, пропилгидроксibenзоат - 0.08 мг, титана диоксид (E171) - 0.98 мг, желатин - до 63 мг.

- 8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (3) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (4) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (5) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (6) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (7) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al) (8) - пачки картонные.
- 16 шт. - блистеры из мягкой алюминиевой фольги/жесткой полимерной пленки (Al/PVC/PVDC) (1) - пачки картонные.
- 16 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
- 32 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат, нормализующий микрофлору кишечника. Одна капсула препарата содержит не менее  $1.2 \times 10^7$  живых лиофилизированных молочнокислых бактерий: *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*. Живые молочнокислые бактерии являются нормальной составляющей естественной микрофлоры кишечника и содержатся уже в пищеварительном тракте новорожденного.

Входящие в состав Линекса бифидобактерии, лактобациллы и энтерококки вызывают сдвиг pH кишечника в кислую сторону за счет брожения лактозы, при этом кислая среда угнетает рост патогенных и условно-патогенных бактерий и обеспечивает оптимальное действие пищеварительных ферментов; участвуют в синтезе витаминов В, К, аскорбиновой кислоты, повышая тем самым резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды; участвуют в метаболизме желчных кислот и желчных пигментов; синтезируют вещества с антибактериальной активностью; повышают иммунную реактивность организма.

### Фармакокинетика

В настоящее время отсутствуют фармакокинетические модели для исследования у человека сложных биологических веществ, состоящих из компонентов с различной молекулярной массой.

## Показания к применению:

— лечение и профилактика дисбактериоза.

Дисбактериоз проявляется диареей, диспепсией, запором, метеоризмом, тошнотой, рвотой, отрыжкой, болями в животе; возможны аллергические реакции.

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Диарея](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Диспепсия](#)
- [Запор](#)
- [Метеоризм](#)
- [Отрыжка](#)
- [Тошнота](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или к молочным продуктам.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь после приема пищи, капсулы следует запивать небольшим количеством воды. Детям в возрасте до 3 лет и пациентам, которые не могут проглотить капсулу, следует вскрыть ее, высыпать содержимое в ложку и смешать с небольшим количеством воды.

**Новорожденным и детям в возрасте до 2 лет** назначают по 1 капсуле 3 раза/сут.

**Детям в возрасте от 2 до 12 лет** - по 1-2 капсулы 3 раза/сут.

**Взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 2 капсулы 3 раза/сут.

Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.

## Побочное действие:

Препарат хорошо переносится. Сведений о нежелательных реакциях нет, однако нельзя исключить возможность развития реакций повышенной чувствительности.

## **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Линекс не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности и в период лактации считается безопасным.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не отмечено нежелательного взаимодействия Линекса с другими препаратами.

Состав препарата Линекс позволяет принимать его одновременно с антибиотиками и химиотерапевтическими средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется запивать Линекс горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем.

Пациент должен обратиться к врачу, если перед началом приема препарата у него отмечается температура тела выше 38°C, отмечается кровь или слизь в стуле, диарея продолжается более 2 дней и сопровождается острыми болями в животе, обезвоживанием и потерей массы тела, при наличии хронических заболеваний (СПИД, сахарный диабет).

При лечении диареи необходимо возмещение потерянной жидкости и электролитов.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния.

### **Применение в детском возрасте**

Применяется у детей по показаниям.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Lineks>