Линекс Гастро



Код АТХ:

- A07FA51

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** непрозрачные, корпус белого цвета, крышечка желтого цвета; содержимое капсулы - светло-бежевый порошок с вкраплениями желтого цвета.

	1 капс.
порошок Пробио-тек АБ Бленд 64	60 мг,
в т.ч. Lactobacillus acidophilus (LA-5)	13.8 мг
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12)	4.2 мг

Вспомогательные вещества: Бенео Синерджи 1 - 171.5 мг (порошок содержит 90-94% инулина и 6-10% олигофруктозы), магния стеарат - 3.5 мг.

7 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
7 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Линекс Гастро нормализует микрофлору кишечника.

Одна капсула препарата Линекс Гастро содержит молочнокислые бактерии (Lactobacillus acidophilus (LA-5) и Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12)), каждая капсула содержит 10^9 колониеобразующих единиц живых лиофилизированных молочнокислых бактерий. Живые молочнокислые бактерии являются нормальной составляющей естественной микрофлоры кишечника.

Основные функции молочнокислых бактерий:

• защитная: синтез веществ с антибактериальной активностью;

• ферментопродуцирующая: гидролиз клетчатки, белков, жиров, крахмала, деконъюгация желчных кислот синтетическая: синтез витаминов группы B, C, K, аминокислот, органических кислот и т.д.

Молочнокислые бактерии LA-5 и BB-12 ингибируют рост патогенных бактерий посредством:

• снижения pH в кишечнике (результат способности LA-5 синтезировать молочную кислоту и BB-12 синтезировать уксусную и янтарную кислоты в дополнение к молочной кислоте);

• выработки метаболитов, которые обладают токсическим действием в отношении патогенных бактерий (образование H_2O_2);

• образования противомикробных веществ, бактериоцинов (LA-5 секретирует ацидоцин, бактериоцин широкого спектра действия, который препятствует росту бактерий и грибов);

• конкуренции с патогенными бактериями за питательные вещества;

• взаимодействия с рецепторами адгезии, предотвращая таким образом колонизацию других, потенциально патогенных микроорганизмов.

Фармакокинетика

Молочнокислые бактерии, такие как LA-5 и BB-12, действуют непосредственно в желудочно-кишечном тракте, при приеме внутрь препарат не подвергается системному всасыванию. Стандартные фармакокинетические исследования, таким образом, не применимы. Устойчивость LA-5 и BB-12 к воздействию желудочного сока и желчи позволяет штаммам в большом количестве выживать при прохождении через желудок и двенадцатиперстную кишку. Оба штамма прикрепляются к слизистой кишечника. Подобно другим микроорганизмам, они постепенно выводятся из желудочно-кишечного тракта перистальтикой и дефекацией.

Показания к применению:

— лечение и профилактика дисбактериоза кишечника.

Дисбактериоз кишечника проявляется следующими симптомами: диарея (понос), диспепсия (нарушение пищеварения), запоры, метеоризм (вздутие живота), тошнота, отрыжка, рвота, боли в животе, возможны аллергические кожные реакции.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Вздутие живота
- Диарея
- Дисбактериоз
- Диспепсия
- Запор
- Метеоризм
- Отрыжка
- Рвота
- Тошнота

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— наследственная непереносимость фруктозы, дефицит сахаразы, изомальтазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью: при сахарном диабете (в состав входят простые сахара), недостаточность иммунной системы (например, ВИЧ-инфекция).

Диарею у детей младше 6 лет необходимо лечить под наблюдением врача.

Способ применения и дозы:

Капсулы Линекс Гастро предпочтительно принимать во время или после еды, запивая небольшим количеством жидкости.

Взрослые и подростки старше 12 лет: по 1 капсуле 1-3 раза в день. **Дети от 2 до 12 лет:** по 1 капсуле 1-2 раза вдень. **Новорожденные и дети до 2-х лет:** по 1 капсуле 1 раз в день. Диарею у детей младше 6 лет необходимо лечить под наблюдением врача. При назначении Линекс Гастро детям и пациентам, которые не могут проглотить

целую капсулу, ее необходимо вскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости.

Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма. Препарат Линекс Гастро можно принимать до исчезновения симптомов дисбактериоза. Не следует превышать рекомендованные ежедневные дозы препарата.

Побочное действие:

Препарат хорошо переносится. Сообщений о нежелательных эффектах нет, однако могут отмечаться реакции гиперчувствителыюсти.

Передозировка:

Данных о симптомах передозировки нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Из-за отсутствия данных по применению у беременных женщин не рекомендуется применять капсулы Линекс Гастро во время беременности и кормления ребенка грудью без предварительной консультации врача. При назначении препарата для лечения острой диареи во время беременности и кормлении грудью необходимо наблюдение врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нежелательного взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечено.

При одновременном применении антибиотиков рекомендованный интервал между приемом лекарственного средства (антибиотика) и капсул Линекс Гастро составляет 3 ч.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует запивать Линекс Гастро горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем.

Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом препарата, если у Вас:

- температура тела выше 38°С;

- следы крови или слизи в стуле;

- диарея длится более двух дней и сопровождается острыми болями в животе, обезвоживанием и потерей веса;

- хронические заболевания - сахарный диабет, ВИЧ-инфекция.

При лечении диареи необходимо возмещение потерянной жидкости и электролитов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на вождение автотранспорта и управление механизмами.

Специальные меры предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата

Нет необходимости в специальных мерах предосторожности при уничтожении неиспользованного препарата Линекс Гастро.

Применение в детском возрасте

Диарею у детей младше 6 лет необходимо лечить под наблюдением врача.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lineks_Gastro