Линкас ОРВИ

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь (шоколадные)*** коричневого цвета, с запахом шоколада при растирании.

	1 саше
густой водный экстракт (1:5)	400 мг,
приготовленный из:	
коры ивы белой	750 мг*
листьев адхатоды сосудистой	300 мг*
листьев и цветков фиалки пахучей	100 мг*
корневищ с корнями солодки голой	550 мг*
листьев чая китайского	125 мг*
плодов фенхеля обыкновенного	75 мг*
листьев эвкалипта шаровидного	35 мг*
корневищ с корнями валерианы лекарственной	100 мг*

Вспомогательные вещества: левоментол - 5 мг, крахмал кукурузный - 20 мг, сахароза - до 5.6 г, ароматизатор шоколадный (Шоколад Д-0970) - 0.067 мл, какао-бобов порошок - 0.056 мг.

5.6 г - саше (пакет из трехслойной фольги) (5) - пачки картонные.

* данное количество высушенных растений используется для приготовления густого водного экстракта.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный растительный препарат, применяемый при простудных заболеваниях.

Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, муколитическое, а также жаропонижающее действие.

Фармакокинетика

Поскольку препарат является многокомпонентным растительным лекарственным средством, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия ОРВИ (при повышении температуры тела до 38°C, головной боли, заложенности носа, болезненности при глотании, кашле).

Относится к болезням:

- ОРВИ

Противопоказания:

Беременность; период лактации (грудного вскармливания); детский и подростковый возраст до 18 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым внутрь по 1 саше 2-3 раза/сут после приема пищи. Содержимое 1 саше следует растворить в стакане горячей воды и медленно выпить.

Курс лечения составляет 7-8 дней. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

При повышенной индивидуальной чувствительности возможно возникновение аллергических реакций.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять при тяжелых нарушениях функции печени, почек, сердечно-сосудистой системы, повышенной свертываемости крови.

В случае повышения температуры тела выше 38°C, усиления кашля, появлении хрипов в легких, гнойной мокроты, ринореи с гнойным отделяемым, ангины приём препарата следует прекратить и обратиться к врачу; назначается антибактериальная терапия, НПВС.

Источник: http://drugs.thead.ru/Linkas_ORVI