

Лиотон 1000



Код АТХ:

- [C05BA03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гепарин натрия](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Гель для наружного применения** бесцветный или со слегка желтоватым оттенком, почти прозрачный, вязкой консистенции.

	100 г
гепарин натрия	100 000 ME

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксibenзоат - 0.12 г, пропилпарагидроксibenзоат - 0.03 г, карбомер 940 - 1.25 г, этиловый спирт 96% (этанол) - 30 мл, неролиевое масло - 0.05 г, лавандовое масло - 0.05 г, триэтаноламин (троламин) - 0.85 г, вода очищенная - до 100 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с антитромботическим действием для наружного применения. Оказывает также антиэкссудативное, умеренное противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

$C_{\max}$ в крови достигается через 8 ч после аппликации и возвращается к исходному уровню через 12-24 ч.

Выводится в основном с мочой.

Показания к применению:

- тромбозы поверхностных вен, флеботромбоз;
- осложнения после хирургических операций на венах;
- локализованные инфильтраты и отеки;
- травмы, ушибы (в т.ч. мышечной ткани, сухожилий, суставов);
- подкожные гематомы.

Относится к болезням:

- [Гематомы](#)
- [Инфильтраты](#)
- [Отеки](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)
- [Флебит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к гепарину.

Способ применения и дозы:

На кожу в области поражения наносят 3-10 см геля 1-3 раза/сут и осторожно втирают.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с малой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по строгим показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие Лиотона 1000 не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, на слизистых оболочках и при гнойных процессах.

С осторожностью применяют Лиотон 1000 при повышенной кровоточивости.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lioton_1000