Лиотон 1000



Код АТХ:

- C05BA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гепарин натрия

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** бесцветный или со слегка желтоватым оттенком, почти прозрачный, вязкой консистенции.

	100 г
гепарин натрия	100 000 МЕ

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 0.12 г, пропилпарагидроксибензоат - 0.03 г, карбомер 940 - 1.25 г, этиловый спирт 96% (этанол) - 30 мл, неролиевое масло - 0.05 г, лавандовое масло - 0.05 г, триэтаноламин (троламин) - 0.85 г, вода очищенная - до 100 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с антитромботическим действием для наружного применения. Оказывает также антиэкссудативное, умеренное противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

C_{max} в крови достигается через 8 ч после аппликации и возвращается к исходному уровню через 12-24 ч.

Выводится в основном с мочой.

Показания к применению:

— тромбофлебиты поверхностных вен, флеботромбоз;

— осложнения после хирургических операций на венах;

— локализованные инфильтраты и отеки;

— травмы, ушибы (в т.ч. мышечной ткани, сухожилий, суставов);

— подкожные гематомы.

Относится к болезням:

- Гематомы
- Инфильтраты
- Отеки
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Ушиб
- Ушибы
- Флебит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к гепарину.

Способ применения и дозы:

На кожу в области поражения наносят 3-10 см геля 1-3 раза/сут и осторожно втирают.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с малой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по строгим показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие Лиотона 1000 не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, на слизистых оболочках и при гнойных процессах.

С осторожностью применяют Лиотон 1000 при повышенной кровоточивости.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lioton_1000