

Лив. 52 К



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com^{англ}](#)

Форма выпуска:

Лив. 52

◊ **Таблетки** зеленовато-серого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
порошок корней каперсов колючих	65 мг
порошок семян цикория обыкновенного	65 мг
железа оксид (мандур басма)	33 мг
порошок паслена черного	32 мг
порошок коры терминалии аржуна	32 мг
порошок семян кассии западной	16 мг
порошок травы тысячелистника обыкновенного	16 мг
порошок тамарикса гальского	16 мг,
обработанные над паром экстракта из смеси лекарственного сырья: эклипты белой, филантуса нирури, берхавии раскидистой, тиноспоры сердцелистной, редьки посевной, эмблики лекарственной, свинчатки цейлонской, эмбелии смородиновой, терминалии хебула (мирбаланового дерева), дымянки лекарственной.	
Вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза.	

100 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Лив. 52 к

◊ **Капли д/приема внутрь** в виде жидкости темно-коричневого цвета.

	1 мл
жидкий водный экстракт (1:10) из смеси растительного сырья	135 мг,
что соответствует содержанию сухого вещества	62 мг
в т.ч. экстракт корней каперсов колючих	17 мг
экстракт семян цикория обыкновенного	17 мг
экстракт паслена черного	8 мг
экстракт коры терминалии аржуна	8 мг
экстракт семян кассии западной	4 мг
экстракт травы тысячелистника обыкновенного	4 мг
экстракт тамарикса гальского	4 мг,
обработанные над паром водного экстракта (1:10) из смеси лекарственного сырья (взятого в равных количествах по 0.64 мг): эклипты белой, филантуса нирури, корней берхавии раскидистой, стеблей тиноспоры сердцелистной, семян редьки посевной, плодов эмблики лекарственной, корней свинчатки цейлонской, плодов эмбелии смородиновой, кожуры плодов терминалии хебула, дымянки лекарственной.	

Вспомогательные вещества: сахароза, натрия цитрат, натрия метилпарабен, натрия пропилпарабен, ароматизатор персиковый (abrak S168), ароматизатор персиковый №1, вода очищенная.

60 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с пипеткой-дозатором - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный растительный препарат. Оказывает гепатопротекторное, антитоксическое, противовоспалительное, желчегонное, антиоксидантное, антианорексическое действие. Способствует улучшению процесса пищеварения и усвоения пищи.

Гепатопротекторное действие Лив. 52 обусловлено антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами входящих в его состав компонентов. Препарат повышает уровень эндогенных токоферолов в гепатоцитах и уровень цитохрома Р₄₅₀. Лив. 52 стимулирует биосинтез белков и фосфолипидов. Способствует восстановлению гепатоцитов, уменьшает дегенеративные, жировые и фиброзные изменения, усиливает внутриклеточный обмен.

Препарат регулирует уровень плазменных белков крови, нормализуя соотношение альбумин/глобулин. Обеспечивает нормализацию уровня плазменных трансаминаз, холестерина, триглицеридов, уменьшая проявления дислипидемии. Снижает показатели билирубина и щелочной фосфатазы. Повышает способность печени к депонированию гликогена.

Улучшает коллоидные свойства желчи, предупреждает образование желчных камней. Улучшает сократительную функцию желчного пузыря.

Стимулирует гемопоэз.

При алкогольном поражении печени препарат снижает уровень этанола в крови и моче; повышает активность ацетальдегиддегидрогеназы, что способствует снижению уровня ацетальдегида; предотвращает связывание ацетальдегида с белками клетки, ускоряет его выведение. Предотвращая повреждающее действие ацетальдегида на гепатоциты, препарат снижает риск развития "похмельного" синдрома.

Фармакокинетика

Терапевтический эффект Лив. 52 обусловлен совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания к применению:

- острые и хронические инфекционные, токсические и лекарственные гепатиты;
- цирроз печени у взрослых;
- жировой гепатоз;
- анорексия;
- профилактика токсических поражений печени (вызываемых антибиотиками, противотуберкулезными препаратами, жаропонижающими средствами).

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Жар](#)
- [Жировой гепатоз](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- лактация.

Способ применения и дозы:

С профилактической целью препарат назначают по 2 таб. 2 раза/сут.

С лечебной целью **детям старше 6 лет** назначают по 1-2 таб. 2-3 раза/сут, **взрослым** - 2-3 таб. 2-3 раза/сут.

Препарат в форме капель назначают с лечебной и профилактической целью **детям старше 2 лет** по 10-20 капель 2 раза/сут, **взрослым** - по 80-160 капель (1-2 чайные ложки) 2 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата Лив.52 отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Лив.52 не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с острыми заболеваниями ЖКТ.

Лив. 52 К (лекарственная форма - капли) не содержит этиловый спирт и может применяться у детей с заболеваниями печени и желчевыводящих путей.

Применение в детском возрасте

С лечебной целью **детям старше 6 лет** назначают по 1-2 таб. 2-3 раза/сут.

Препарат в форме капель назначают с лечебной и профилактической целью **детям старше 2 лет** по 10-20 капель 2 раза/сут

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом месте при температуре от 10° до 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Liv_52_K