Ливарол (свечи)

Код АТХ:

- G01AF11

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кетоконазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Суппозитории вагинальные, 400 мг. В контурной ячейковой упаковке, 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке картонной.

Состав:

Суппозитории вагинальные	1 супп.
активное вещество:	
кетоконазол	400 мг
вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол — 0,5 мг; основа для суппозиториев (макрогол 1500 — 92–98%, макрогол 400 — 8–2%) — до получения суппозитория массой 3 г	

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — фунгицидное, фунгистатическое.

Показания к применению:

— лечение острого и хронического рецидивирующего вагинального кандидоза;

— профилактика грибковых инфекций влагалища при пониженной резистентности организма и на фоне лечения антибактериальными средствами и другими препаратами, нарушающими нормальную микрофлору влагалища.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Инфекции

Противопоказания:

— I триместр беременность;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат во II и III триместрах беременности, в период лактации, детям до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Перед применением препарата суппозитории вагинальные следует освободить из контурной упаковки.

Суппозитории вводят глубоко во влагалище в положении лежа на спине 1 раз/сут в течение 3-5 дней в зависимости от течения заболевания.

При *хроническом кандидозе* назначают по 1 суппозиторию в течение 10 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: гиперемия и раздражение слизистой оболочки влагалища, зуд влагалища.

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Ливарол не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан в I триместре беременности.

При применении препарата во II и III триместрах беременности и в период лактации следует соблюдать осторожность.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении Ливарола с другими лекарственными средствами не отмечено нежелательного взаимодействия, и оно маловероятно из-за низкой резорбционной способности кетоконазола.

Особые указания и меры предосторожности:

В редких случаях возможны аллергические реакции (гиперемия полового члена) у полового партнера.

Для снижения риска рецидива заболевания рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Livarol_svechi