

## Ливенциале



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Фосфолипиды](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Раствор для в/в введения** прозрачный, желтого цвета, со специфическим запахом.

	<b>5 мл</b>
фосфолипиды соевых бобов в пересчете на фосфатидилхолин	250 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидроксид 0.1 М q.s. до pH 7.5-9.5, спирт бензиловый - 45 мг, вода д/и - до 5 мл.

5 мл - ампулы темного стекла (5) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Гепатопротекторное средство; входящие в состав фосфолипиды являются основными элементами в структуре клеточной оболочки и митохондрий. Регулирует липидный и углеводный обмен, улучшает функциональное состояние печени и ее дезинтоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов; тормозит формирование соединительной ткани в печени.

#### **Фармакокинетика**

Связываясь главным образом с липопротеинами высокой плотности, фосфатидилхолин поступает, в частности в клетки печени.

Период полувыведения холинового компонента составляет 66 ч, а ненасыщенных жирных кислот - 32 ч.

## Показания к применению:

- жировая дистрофия печени (в т.ч., при сахарном диабете);
- острые и хронические гепатиты, цирроз печени, некроз клеток печени, печеночная кома и прекома, токсические поражения печени;
- токсикоз беременности;
- пред- и послеоперационное лечение, особенно, при операциях в области гепатобилиарной зоны;
- псориаз (в качестве вспомогательной терапии);
- радиационный синдром.

## Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Жировая дистрофия печени](#)
- [Кома](#)
- [Некроз клеток печени](#)
- [Печеночная кома](#)
- [Псориаз](#)
- [Радиационный синдром](#)
- [Сахарный диабет](#)
- [Токсикоз](#)
- [Токсикоз беременности](#)
- [Токсикоз беременных](#)
- [Цирроз печени](#)

## Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- детский возраст до 18 лет;
- непереносимость сои.

*С осторожностью*

- беременность.

## Способ применения и дозы:

Внутривенно (капельно, со скоростью 40-50 кап/мин, растворяя в 250-300 мл 5% раствора декстрозы, или в/в струйно, предварительно разведя кровью пациента в соотношении 1:1), 1-2 ампулы (5-10 мл) в сутки или в тяжелых случаях 2-4 ампулы (10-20 мл) в сутки. По мере улучшения состояния больного парентеральное введение как можно быстрее заменить пероральным приемом препарата. Курс лечения - 3 месяца, при необходимости может быть продолжен или повторен.

Лечение *псориаза* начинают с 2-недельного приема капсул (по 600 мг 3 раза в день), затем проводится 10 внутривенных вливаний по 250 мг ежедневно и одновременно начинается ПУВА-терапия. После завершения вливаний возобновляют прием капсул на протяжении 2 месяцев. При наличии противопоказаний к ПУВА-терапии ограничиваются применением препарата по приведенной методике, в т.ч. в сочетании с общепринятыми методами лечения псориаза.

Нельзя разводить препарат электролитными растворами (0.9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера)!

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* при применении в высоких дозах - диарея.

*Со стороны иммунной системы:* реакции повышенной чувствительности, в т.ч. кожные аллергические реакции: кожная сыпь, кожный зуд, экзантема или крапивница.

## **Передозировка:**

О случаях передозировки не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности, в связи с наличием в составе препарата бензилового спирта, который может проникать через плацентарный барьер (применение препаратов, содержащих бензиловый спирт, у рожденных в срок новорожденных или недоношенных новорожденных ассоциировалось с развитием у них одышки с летальным исходом), применение препарата возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

Не рекомендуют применять в период грудного вскармливания в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Фармацевтически несовместим с растворами электролитов.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Парентерально следует вводить только прозрачные растворы.

## **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре от 2° до 8°С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

3 года.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Livenciale>