Ливенциале



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фосфолипиды

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для в/в введения прозрачный, желтого цвета, со специфическим запахом.

	5 мл
фосфолипиды соевых бобов в пересчете на фосфатидилхолин	250 мг

Вспомогательные вещества: натрия гидроксид 0.1 М q.s. до pH 7.5-9.5, спирт бензиловый - 45 мг, вода д/и - до 5 мл.

5 мл - ампулы темного стекла (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротекторное средство; входящие в состав фосфолипиды являются основными элементами в структуре клеточной оболочки и митохондрий. Регулирует липидный и углеводный обмен, улучшает функциональное состояние печени и ее дезинтоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов; тормозит формирование соединительной ткани в печени.

Фармакокинетика

Связываясь главным образом с липопротеинами высокой плотности, фосфатидилхолин поступает, в частности в клетки печени.

Период полувыведения холинового компонента составляет 66 ч, а ненасыщенных жирных кислот - 32 ч.

Показания к применению:

— жировая дистрофия печени (в т.ч., при сахарном диабете);

— острые и хронические гепатиты, цирроз печени, некроз клеток печени, печеночная кома и прекома, токсические поражения печени;

— токсикоз беременности;

— пред- и послеоперационное лечение, особенно, при операциях в области гепатобилиарной зоны;

— псориаз (в качестве вспомогательной терапии);

— радиационный синдром.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Жировая дистрофия печени
- Кома
- Некроз клеток печени
- Печеночная кома
- Псориаз
- Радиационный синдром
- Сахарный диабет
- Токсикоз
- Токсикоз беременности
- Токсикоз беременных
- Цирроз печени

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— детский возраст до 18 лет;

— непереносимость сои.

С осторожностью

— беременность.

Способ применения и дозы:

Внутривенно (капельно, со скоростью 40-50 кап/мин, растворяя в 250-300 мл 5% раствора декстрозы, или в/в струйно, предварительно развести кровью пациента в соотношении 1:1), 1-2 ампулы (5-10 мл) в сутки или в тяжелых случаях 2-4 ампулы (10-20 мл) в сутки. По мере улучшения состояния больного парентеральное введение как можно быстрее заменить пероральным приемом препарата. Курс лечения - 3 месяца, при необходимости может быть продолжен или повторен.

Лечение *псориаза* начинают с 2-недельного приема капсул (по 600 мг 3 раза в день), затем проводится 10 внутривенных вливаний по 250 мг ежедневно и одновременно начинается ПУВА-терапия. После завершения вливаний возобновляют прием капсул на протяжении 2 месяцев. При наличии противопоказаний к ПУВА-терапии ограничиваются применением препарата по приведенной методике, в т.ч. в сочетании с общепринятыми методами лечения псориаза.

Нельзя разводить препарат электролитными растворами (0.9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера)!

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: при применении в высоких дозах - диарея.

Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в т.ч. кожные аллергические реакции: кожная сыпь, кожный зуд, экзантема или крапивница.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности, в связи с наличием в составе препарата бензилового спирта, который может проникать через плацентарный барьер (применение препаратов, содержащих бензиловый спирт, у рожденных в срок новорожденных или недоношенных новорожденных ассоциировалось с развитием у них одышки с летальным исходом), применение препарата возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

Не рекомендуют применять в период грудного вскармливания в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фармацевтически несовместим с растворами электролитов.

Особые указания и меры предосторожности:

Парентерально следует вводить только прозрачные растворы.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 2° до 8°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Livenciale