

Ливолин Форте



Код АТХ:

- [A05C](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капсулы** мягкие желатиновые, размер №2, коричневого цвета; содержимое капсул - пастообразная масса темно-желтого цвета.

	1 капс.
лецитин	857.13 мг,
содержащий фосфатидилхолин	300 мг
токоферола ацетат	10 мг
тиамина мононитрат	10 мг
рибофлавин	6 мг
пиридоксина гидрохлорид	10 мг
цианокобаламин	10 мкг
никотинамид	30 мг

Вспомогательные вещества: масло соевое, масло растительное безводное, воск белый.

Состав капсулы: желатин, глицерол, вода очищенная, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный, железа оксид желтый.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (3) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротектор. Основным действующим веществом препарата являются "эссенциальные" фосфолипиды, главными компонентами которых являются полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, олеиновая) и фосфатидилхолин. В состав препарата входит высокоочищенная фракция фосфатидилхолина, выделенная из соевых бобов, обогащенная полиненасыщенными жирными кислотами, что позволяет сохранить большую часть препарата в двенадцатиперстной кишке от воздействия фосфолипазы A₂.

Значительная часть "эссенциальных" фосфолипидов поступает в кровь и встраивается в клеточные и субклеточные мембраны.

Препарат регулирует углеводный и липидный обмен, улучшает функциональное состояние печени, ее детоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов, тормозит формирование соединительной ткани в печени.

В состав препарата также входят витамины группы B и витамин E.

Тиамин (витамин B₁) в качестве кофермента участвует в углеводном обмене.

Рибофлавин (витамин B₂) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.

Пиридоксин (витамин B₆) в качестве кофермента принимает участие в метаболизме аминокислот и белков.

Цианокобаламин (витамин B₁₂) вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов.

Никотинамид (витамин PP) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.

Токоферол (витамин E) обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах от перекисного окисления липидов.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- острого и хронического гепатита;
- жировой дистрофии печени различного генеза (сахарный диабет, хронические инфекции);
- токсического гепатита;
- цирроза печени;
- токсикоза беременности;
- лучевой болезни;
- интоксикации;
- псориаза;
- нарушений функции печени при других соматических заболеваниях.

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Псориаз](#)
- [Сахарный диабет](#)
- [Токсикоз](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 капсулы 2-3 раза/сут. Продолжительность лечения составляет не менее 3 месяцев; при необходимости возможно более длительное применение препарата или проведение повторных курсов лечения.

Капсулы принимают во время приема пищи, запивая водой.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боли в животе.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ливолин Форте не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Ливолин Форте не описано.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Livolin_Forte