Ливолин Форте



Код АТХ:

- A05C

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** мягкие желатиновые, размер №2, коричневого цвета; содержимое капсул - пастообразная масса темно-желтого цвета.

	1 капс.
лецитин	857.13 мг,
содержащий фосфатидилхолин	300 мг
токоферола ацетат	10 мг
тиамина мононитрат	10 мг
рибофлавин	6 мг
пиридоксина гидрохлорид	10 мг
цианокобаламин	10 мкг
никотинамид	30 мг

Вспомогательные вещества: масло соевое, масло растительное безводное, воск белый.

Состав капсулы: желатин, глицерол, вода очищенная, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный, железа оксид желтый.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротектор. Основным действующим веществом препарата являются "эссенциальные" фосфолипиды, главными компонентами которых являются полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, олеиновая) и фосфатидилхолин. В состав препарата входит высокоочищенная фракция фосфатидилхолина, выделенная из соевых бобов, обогащенная полиненасыщенными жирными кислотами, что позволяет сохранить большую часть препарата в двенадцатиперстной кишке от воздействия фосфолипазы A_2.

Значительная часть "эссенциальных" фосфолипидов поступает в кровь и встраивается в клеточные и субклеточные мембраны.

Препарат регулируют углеводный и липидный обмен, улучшает функциональное состояние печение, ее детоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов, тормозит формирование соединительной ткани в печени.

В состав препарата также входят витамины группы В и витамин Е.

Тиамин (витамин B_1) в качестве кофермента участвует в углеводном обмене.

Рибофлавин (витамин B_2) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.

Пиридоксин (витамин B_6) в качестве кофермента принимает участие в метаболизме аминокислот и белков.

Цианокобаламин (витамин B_{12}) вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов.

Никотинамид (витамин РР) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.

Токоферол (витамин Е) обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах от перекисного окисления липидов.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— острого и хронического гепатита;

— жировой дистрофии печени различного генеза (сахарный диабет, хронические инфекции);

— токсического гепатита;

— цирроза печени;

— токсикоза беременности;

— лучевой болезни;

— интоксикации;

— псориаза;

— нарушений функции печени при других соматических заболеваниях.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Интоксикация
- Инфекции
- Псориаз
- Сахарный диабет
- Токсикоз

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 капсулы 2-3 раза/сут. Продолжительность лечения составляет не менее 3 месяцев; при необходимости возможно более длительное применение препарата или проведение повторных курсов лечения.

Капсулы принимают во время приема пищи, запивая водой.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боли в животе.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ливолин Форте не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Ливолин Форте не описано.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Livolin_Forte