

Лизобакт



Код АТХ:

- [R02AA20](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лизоцим](#)
- [Пиридоксин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Таблетки для рассасывания** белого или белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, круглые, с разделительной риской с одной стороны.

	1 таб.
лизоцима гидрохлорид	20 мг
пиридоксина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 155.4 мг, камедь трагакантовая - 10 мг, магния стеарат - 4 мг, натрия сахаринат - 500 мкг, ванилин - 100 мкг.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептик комбинированного состава для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Действие препарата обусловлено входящими в его состав компонентами.

Лизоцим является ферментом белковой природы (муколитический фермент мукопептид-N-ацетилмурамил-гидролаза) и применяется как антисептик (вызывает лизис клеточной мембраны грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов и вирусов). Принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета.

Пиридоксин оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта (оказывает антиафтозный эффект). Не влияет на фармакодинамические свойства лизоцима.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани:

- гингивит;
- стоматит;
- катаральные явления верхних отделов дыхательных путей;
- афтозные изъязвления;
- герпетические поражения слизистой оболочки полости рта (в составе комплексной терапии);
- эрозии слизистой оболочки полости рта различной этиологии;

Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

- наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют местно в полости рта. **Взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 2 таб. 3-4 раза/сут, **детям в возрасте 3-7 лет** - по 1 таб. 3 раза/сут, **детям в возрасте 7-12 лет** - по 1 таб. 4 раза/сут. Курс лечения - 8 дней.

Таблетки препарата Лизобакт следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблетки в полости рта как можно дольше, до полного растворения.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы передозировки маловероятны, могут отмечаться после применения в дозах значительно превышающих терапевтические и проявляются чувством онемения, ощущением покалывания, а также потерей чувствительности в

Лизобакт

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

области верхних и нижних конечностей.

Лечение: обильное питье (форсированный диурез).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Лизобакт по показаниям при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При совместном применении Лизобакт усиливает терапевтический эффект антибиотиков, в т.ч. пенициллина, хлорамфеникола, нитрофурантоина, усиливает действие диуретиков, ослабляет активность леводопы.

Изониазид, пеницилламин, пиразинамид, иммуносупрессоры, эстрогены и пероральные контрацептивы могут усиливать потребность в пиридоксине (антагонистическое действие по отношению к пиридоксину или увеличение ренальной экскреции).

Особые указания и меры предосторожности:

В случае появления аллергической реакции применение препарата необходимо прекратить.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 3-х лет. Применение препарата у детей старше 3-х лет возможно согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 10° до 30°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Lizobakt>