Лоцерил



Код АТХ:

- D01AE16

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аморолфин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения 5%***	**1 мл**
аморолфин	50 мг

Вспомогательные вещества: сополимер метакриловой кислоты, триацетин, этилацетат, бутилацетат, этанол.

2.5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с тампонами для очистки N16, лопаточками N10 и одноразовыми пилочками для ногтей N30 - пачки картонные.
5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с тампонами для очистки N16, лопаточками N10 и одноразовыми пилочками для ногтей N30 - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат для наружного применения. Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие,

основанное на изменении клеточной мембраны гриба путем нарушения биосинтеза стеринов. Аморолфин ингибирует два различных фермента, участвующих в биосинтезе эргостерола - дельта14-редуктазу и дельта7-дельта8-изомеразу.

Аморолфин обладает широким спектром действия, *активен в отношении* грибов рода Candida, Pityrosporum, Cryptococcus, Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, Alternaria, Hendersonula, Scopulariopsis, Cladosporium, Fonseceae, Wangiella, Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix.

Бактерии, за исключением Actinomyces, не являются чувствительными к аморолфину. Propionibacterium acnes проявляет лишь слабую чувствительность.

Фармакокинетика

При нанесении раствора на ногти аморолфин проникает в ногтевую пластинку и далее в ногтевое ложе. Аморолфин практически полностью проникает в ногтевую пластинку в течение первых 24 ч. Эффективная концентрация аморолфина сохраняется в пораженной ногтевой пластинке в течение 7-10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительна: концентрация аморолфина в плазме находится ниже предела чувствительности методов определения (менее 0.5 нг/мл).

Показания к применению:

—лечение поражений ногтей, вызванных различными видами грибов (в виде монотерапии в том случае, если поражено не более 2/3 ногтевой пластинки);

—профилактика грибковых поражений ногтей.

Противопоказания:

—повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

При *онихомикозах* раствор наносят на пораженные ногти пальцев рук или ног 1-2 раза в неделю.

Терапию следует продолжать до регенерации ногтя и полного излечения пораженного участка. Курс лечения составляет в среднем 6 мес для ногтей на руках и 9-12 мес для ногтей на ногах.

Раствор наносят следующим образом: до применения препарата удаляют по возможности пораженные участки ногтя (особенно на его поверхности) с помощью прилагаемой пилки для ногтей. Затем поверхность ногтя очищают и обезжиривают прилагаемым тампоном, смоченным спиртом. Обработку ногтей пилкой и тампоном со спиртом необходимо проводить перед каждым применением препарата. Раствор наносят на всю поверхность пораженного ногтя с помощью лопаточки, дают ему высохнуть. Вышеописанную процедуру повторяют для каждого пораженного ногтя.

Лопаточку следует обмакнуть в раствор, после этого вынимают лопаточку из флакона, не касаясь его горлышка. Горлышко флакона протирают тем же тампоном, которым обрабатывали ноготь, и плотно закрывают флакон сразу же после использования. Дают раствору высохнуть примерно в течение 3 минут. После обработки всех ногтей лопаточку протирают использованным тампоном. Следует избегать контакта обработанных ногтей и тампона; использованный тампон выбрасывают.

Побочное действие:

Местные реакции: возможно жжение.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Лоцерил не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуют применять Лоцерил при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Лоцерил с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Пилки, использованные для обработки пораженных ногтей, не следует использовать для обработки здоровых ногтей.

Лица, работающие с органическими растворителями, должны надевать непроницаемые перчатки для защиты ногтей, покрытых раствором Лоцерил.

Во время лечения Лоцерилом следует избегать использования накладных искусственных ногтей.

Использование в педиатрии

Клинические данные об эффективности и безопасности применения Лоцерила у детей отсутствуют, поэтому не следует назначать Лоцерил детям.

Применение в детском возрасте

Клинические данные об эффективности и безопасности применения Лоцерила у детей отсутствуют, поэтому не следует назначать Лоцерил детям.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в закрытой коробке при температуре не выше 30°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Loceril