Ломексин (крем)



Код АТХ:

• G01AF12

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Фентиконазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$

Форма выпуска:

Крем вагинальный 2% белого или почти белого цвета, однородный.

	100 г
фентиконазола нитрат	2 г

Вспомогательные вещества: вода - 60.5 г, глицерил моностеарат - 3 г, динатрия эдетат - 500 мг, эфир жирных кислот и макрогола - 15 г, ланолин гидрогенизированный - 1 г, масло миндаля - 10 г, пропиленгликоль - 5 г, цетиловый спирт - 3 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

78 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с дозатором - пеналы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

• Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат широкого спектра действия для местного применения. Фентиконазол является синтетическим производным имидазола (его рацемическая смесь в форме азотнокислой соли фентиконазола). Оказывает местное фунгицидное и фунгистатическое действие. Обладает также антибактериальным и противовоспалительным действием. Механизм действия заключается в ингибировании синтеза эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной мембраны грибов.

Активен в отношении дрожжевых грибов Candida spp. (включая Candida albicans) и грамположительных бактерий (Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.), а также в отношении Trichomonas vaginalis.

В отличие от других известных азольных соединений (в частности, эконазола, миконазола и кетоконазола) фентиконазол ингибирует биосинтез протеаз Candida spp.

При концентрациях ниже МПК - от 0.25 до 16 мкг/мл. Это действие не зависит от величины антимикотической активности и обусловлено ингибированием одной из стадий образования протеолитических ферментов дрожжеподобными грибами.

Фармакокинетика

Фентиконазол практически не подвергается системной абсорбции, при длительном местном применении концентрация его в крови не определяется. Степень всасывания слизистыми оболочками крайне незначительна

Показания к применению:

- вульвовагинальный кандидоз;
- вагинальный трихомониаз.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит
- Трихомониаз

Противопоказания:

- І триместр беременности;
- повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Крем вагинальный 2% вводят глубоко во влагалище (приблизительно 5 г) 1 раз/сут вечером, перед сном, при необходимости - 2 раза/сут, утром и вечером.

Лечение проводят до полного клинического выздоровления, обычно 3-6 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - крапивница, сыпь, эритема.

Местные реакции: жжение, зуд, местное раздражение.

Ломексин, как правило, хорошо переносится, побочные эффекты носят транзиторный характер и не требуют отмены препарата.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ломексин не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В настоящее время данные об эффективности и безопасности применения Ломексина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) отсутствуют. Применение препарата в I триместре беременности противопоказано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие или несовместимость препарата Ломексин с другими лекарственными средствами не

описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При продолжительном применении препарата возможно развитие сенсибилизации. В этом случае необходимо прекратить лечение, и пациентка должна обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии эффекта в течение 3 недель терапии лечение следует прекратить и уточнить диагноз.

Препарат нельзя назначать во время менструации. Курс лечения целесообразно начинать после менструации.

Во избежание реинфицирования рекомендуется одновременно проводить лечение партнера кремом, который наносят на головку полового члена и крайнюю плоть.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°C вдали от открытого огня.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lomeksin_krem