

## Лоратадин-Эко



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

♦ **Сироп** в виде прозрачной, бесцветной с желтоватым оттенком жидкости, с характерным запахом.

|           |             |
|-----------|-------------|
|           | <b>1 мл</b> |
| лоратадин | 1 мг        |

Вспомогательные вещества: натрия бензоат - 0.1 г, пропиленгликоль - 29 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.5 г, этанол 95% (этиловый спирт 95%) - 2.6 г, сорбитол (сорбит) - 60 г, ароматизатор банановый МА/1 139 - 0.3 г, вода очищенная - до 100 мл.

90 мл - флаконы (1) в комплекте с мерной ложкой или стаканчиком - пачки картонные.  
100 мл - флаконы (1) в комплекте с мерной ложкой или стаканчиком - пачки картонные.  
110 мл - флаконы (1) в комплекте с мерной ложкой или стаканчиком - пачки картонные.  
115 мл - флаконы (1) в комплекте с мерной ложкой или стаканчиком - пачки картонные.  
125 мл - флаконы (1) в комплекте с мерной ложкой или стаканчиком - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов. Оказывает противоаллергическое, противозудное, антиэкссудативное действие. Уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, уменьшает повышенную сократительную активность гладкой мускулатуры, обусловленную действием гистамина.

#### **Фармакокинетика**

При приеме внутрь в терапевтической дозе лоратадин быстро абсорбируется из ЖКТ и почти полностью метаболизируется в организме. C<sub>max</sub> лоратадина в плазме достигается через 1-1.3 ч, основного активного метаболита, дезкарбоэтоксилоратадина, - примерно через 2.5 ч.

При одновременном приеме пищи биодоступность лоратадина и дезкарбоэтоксилоратадина увеличивается примерно на 40% и 15% соответственно, время достижения C<sub>max</sub> увеличивалось примерно на 1 ч, ее значения для этих веществ оставались без изменений.

Связывание с белками плазмы лоратадина высокое - около 98%, активного метаболита - менее выраженное.

В среднем T<sub>1/2</sub> лоратадина составляет 8.4 ч, дезкарбоэтоксилоратадина - 28 ч (8.8-92 ч).

Около 80% лоратадина выводится в виде метаболитов с мочой и калом в равных соотношениях в течение 10 дней, около 27% - с мочой в течение первых суток.

## Показания к применению:

Сезонный и круглогодичный аллергический ринит, конъюнктивит, острая крапивница и отек Квинке, симптомы гистаминергий, вызванные применением гистаминолибераторов (псевдоаллергические синдромы), аллергические реакции на укусы насекомых, комплексное лечение зудящих дерматозов (контактные алергодерматиты, хронические экземы).

## Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Крапивница](#)
- [Отек Квинке](#)
- [Ринит](#)
- [Экзема](#)

## Противопоказания:

Беременность, лактация, детский возраст до 2 лет, повышенная чувствительность к лоратадину.

## Способ применения и дозы:

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет, а также при массе тела более 30 кг - 10 мг 1 раз/сут.

Детям от 2 до 12 лет при массе тела менее 30 кг - 5 мг 1 раз/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - сухость во рту, тошнота, рвота, гастрит; в отдельных случаях - нарушения функции печени.

*Со стороны ЦНС:* редко - повышенная утомляемость, головная боль, возбудимость (у детей).

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* редко - тахикардия.

*Аллергические реакции:* редко - кожная сыпь; в единичных случаях - анафилактические реакции.

*Дерматологические реакции:* в отдельных случаях - алопеция.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Лоратадин не следует применять при беременности и в период лактации.

В экспериментальных исследованиях на животных лоратадин в средних дозах не оказывал отрицательного влияния на плод, при введении в высоких дозах наблюдались некоторые фетотоксические эффекты.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении лоратадина с препаратами, которые ингибируют изоферменты CYP3A4 и CYP2D6 или метаболизируются в печени при их участии (в т.ч. циметидин, эритромицин, кетоконазол, хинидин, флуконазол, флуоксетин), возможно изменение концентрации в плазме крови лоратадина и/или этих препаратов.

Индукторы микросомального окисления (фенитоин, этанол, барбитураты, зиксорин, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты) снижают эффективность.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При применении лоратадина нельзя полностью исключить развитие судорог, особенно у предрасположенных пациентов.

Пациентам с нарушениями функции почек или печени требуется коррекция режима дозирования.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Loratadin-Eko>