

## Лорета



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

**Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** круглые, двояковыпуклые, желтого цвета, с гравировкой "L900" на одной стороне таблетки и "2.5" на другой; на поперечном разрезе ядро белого цвета.

	<b>1 таб.</b>
летрозол	2.5 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 61.5 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 20 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный - 9.5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 5 мг, магния стеарат - 1 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 0.5 мг.

**Оболочка:** Опадрай желтый (03F32518) - 4 мг (макрогол 8000 - 0.33 мг, тальк - 1.33 мг, гипромеллоза - 1.84 мг, титана диоксид - 0.25 мг, краситель железа оксид желтый - 0.25 мг).

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (9) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противоопухолевое средство. Является нестероидным ингибитором ароматазы - фермента, при участии которого происходит синтез эстрогенов у женщин в постменопаузном периоде. Ароматаза способствует превращению андрогенов, синтезирующихся в надпочечниках (в первую очередь андростендиона и тестостерона), в эстрон и эстрадиол. Торможение активности ароматазы реализуется путем конкурентного связывания с субъединицей этого фермента - гемом цитохрома P450, что приводит к снижению биосинтеза эстрогенов во всех тканях, в т.ч. в тканях эстрогензависимых опухолей.

### Показания к применению:

Лечение злокачественных опухолей молочной железы у женщин в период естественной или искусственно вызванной менопаузы после проведения терапии антиэстрогенными препаратами.

### Относится к болезням:

- [Опухоли](#)

## **Противопоказания:**

Эндокринный статус, характерный для пременопаузного периода; беременность, лактация, повышенная чувствительность к летрозолу.

## **Способ применения и дозы:**

Доза составляет 2.5 мг 1 раз/сут ежедневно. Лечение продолжается в течение периода прогрессирования заболевания.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* головная боль, тошнота, периферические отеки, общая слабость, приливы, истончение волос, кожная сыпь, рвота, диспепсия, увеличение массы тела, мышечно-скелетные боли, анорексия, вагинальные кровотечения, лейкорея, запор, головокружение, повышение аппетита, повышение потоотделения.

*Редко:* одышка, тромбоз, кровянистые выделения из влагалища.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности, в период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Диагнозы

- Мастопатия

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Loreta>