

## Лорнизол



### Код АТХ:

- [G01AF06](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Орнидазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** белого или почти белого цвета, двояковыпуклые, продолговатой формы, со скругленными концами, с риской; на поперечном разрезе внутренний слой белого или почти белого цвета.

	<b>1 таб.</b>
орнидазол	500 мг

**Вспомогательные вещества:** лактоза (сахар молочный), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил), целлюлоза микрокристаллическая, повидон (коллидон 30), натрия кроскармеллоза (примеллоза), тальк, натрия лаурилсульфат, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), макрогол (полиэтиленгликоль 6000), титана диоксид.

- 3 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 3 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 3 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 3 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 3 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противопротозойный препарат. Механизм действия связан с нарушением структуры ДНК чувствительных

## Лорнизол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

микроорганизмов.

Активен в отношении *Trichomonas vaginalis*, *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*, *Gardnerella vaginalis*, а также в отношении некоторых анаэробных бактерий (в т.ч. *Bacteroides* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp. и анаэробных кокков).

### Фармакокинетика

#### Всасывание и распределение

После приема препарата внутрь орнидазол хорошо абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность – 90%.  $C_{max}$  достигается через 1-2 ч.

Связывание с белками плазмы – не менее 15%. Проникает через ГЭБ.

#### Метаболизм и выведение

$T_{1/2}$  - около 13 ч. Выводится в виде метаболитов с мочой (60-70%) и с калом (20-25%), около 5% - в неизменном виде.

## Показания к применению:

- трихомониаз;
- амебиаз, амебная дизентерия, внекишечный амебиаз (в т.ч. амебный абсцесс печени);
- лямблиоз;
- профилактика послеоперационных инфекционных осложнений, вызванных анаэробными бактериями, при хирургическом вмешательстве на толстой кишке и в гинекологических операциях.

## Относится к болезням:

- [Абсцесс](#)
- [Абсцесс печени](#)
- [Амебиаз](#)
- [Амебная дизентерия](#)
- [Дизентерия](#)
- [Инфекции](#)
- [Трихомониаз](#)

## Противопоказания:

- органические заболевания ЦНС;
- I триместр беременности;
- период лактации;
- детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь, после еды.

При *трихомониазе* **взрослым** назначают по 500 мг 2 раза/сут в течение 5 дней. **Детям** дозу устанавливают из расчета 25 мг/кг массы тела 1 раз/сут.

При *амебной дизентерии* **взрослым и детям с массой тела более 35 кг** - по 1.5 г 1 раз/сут, с **массой тела более 60 кг** - 2 г/сут; **детям с массой тела менее 35 кг** суточную дозу устанавливают из расчета 40 мг/кг/сут. Курс лечения – 3 дня.

При *других формах амебиоза* **взрослым и детям с массой тела более 35 кг** - по 500 мг 2 раза/сут (утром и вечером); **детям с массой тела менее 35 кг** - по 25 мг/кг 1 раз/сут в течение 5-10 дней.

## Лорнизол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При *лямблиозе* **взрослым и детям с массой тела более 35 кг** – по 1.5 г 1 раз/сут; **детям с массой тела менее 35 кг** – по 40 мг/кг/сут. Продолжительность терапии составляет 1-2 дня.

Для профилактики инфекционных осложнений, вызванных анаэробными бактериями, назначают по 500 мг перед операцией, затем каждые 12 ч по 500 мг в течение 3-5 дней.

### Побочное действие:

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, усталость, нарушение или временная потеря сознания, тремор, ригидность, нарушение координации движений, судороги, сенсорная или смешанная периферическая невропатия.

Со стороны пищеварительной системы: извращение вкуса, тошнота, диспепсия, изменение активности печеночных ферментов.

Прочие: аллергические реакции.

### Передозировка:

Симптомы: эпилептиформные судороги, депрессия, неврит периферических нервов.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При совместном применении орнидазол усиливает эффекты непрямых антикоагулянтов (производных кумарина), пролонгирует миорелаксирующий эффект векурония бромида.

Возможно совместное применение с этанолом, т.к. в отличие от других производных имидазола орнидазол не ингибирует ацетальдегидрогеназу.

### Особые указания и меры предосторожности:

При лечении трихомониаза следует обязательно лечить половых партнеров.

При употреблении алкоголя на фоне применения препарата не отмечается дисульфирамоподобных реакций (орнидазол не ингибирует ацетальдегидрогеназу).

#### Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы).

### Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

### Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Lornizol>