

## [МЕТРОМИКОН-НЕО \(свечи\)](#)



### Код АТХ:

- [G01AF20](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Метронидазол](#)
- [Миконазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Суппозитории вагинальные, 500 мг + 100 мг. По 7 супп. в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ-пленки. По 2 контурные ячейковые упаковки в пачке картонной.

### Состав:

Суппозитории вагинальные	1 супп.
<i>активные вещества:</i>	
метронидазол	500 мг
миконазола нитрат	100 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> полусинтетические глицериды (Суппоцир АМ) — q.s. для получения суппозитория массой 2000 мг	

### Описание:

Белые или белые с желтоватым оттенком суппозитории торпедообразной формы. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противопротозойное, противогрибковое, антибактериальное.

### Фармакодинамика

МЕТРОМИКОН-НЕО® — комбинированный препарат с противопротозойным, противогрибковым и антибактериальным действием. Содержит метронидазол и миконазол.

Метронидазол относится к 5-нитроимидазолам и является препаратом с бактерицидным типом действия, проявляющим тропность (способность взаимодействия) к ДНК. Механизм действия заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы метронидазола внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа метронидазола взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий.

Активен в отношении простейших — *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, а также облигатных анаэробных бактерий: грамотрицательных — *Bacteroides spp.* (в т.ч. *Bacteroides fragilis*, *Bacteroides distasonis*, *Bacteroides ovatus*, *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides vulgatus*), *Fusobacterium spp.*, *Veillonella spp.*, *Prevotella spp.* (*Prevotella bivia*, *Prevotella buccae*, *Prevotella disiens*); грамположительных — *Clostridium spp.*, *Eubacterium spp.*, *Peptococcus spp.*, *Peptostreptococcus spp.*, *Mobiluncus spp.* и факультативного анаэроба — *Gardnerella vaginalis*.

К метронидазолу нечувствительны аэробные микроорганизмы, но в присутствии смешанной флоры (аэробы и анаэробы) метронидазол действует синергично с антибиотиками, эффективными против обычных аэробов.

Миконазол является противогрибковым средством, производным азола. При интравагинальном применении активен в основном в отношении *Candida albicans*. Фунгицидный и фунгистатический эффект миконазола обусловлен ингибированием биосинтеза эргостерола оболочки и плазматических мембран грибов, изменением липидного состава и проницаемости клеточной стенки; вызывает гибель клетки гриба.

### Фармакокинетика

По сравнению с приемом внутрь биодоступность метронидазола при интравагинальном введении составляет 20%. Метронидазол метаболизируется в печени. Гидроксильные метаболиты активны.

Период полувыведения метронидазола составляет 6 - 11 ч. Около 20% дозы выводится в неизменном виде с мочой.

При интравагинальном введении миконазол всасывается незначительно и в плазме не определяется.

## Показания к применению:

Влагалищные инфекции:

- вагинальный кандидоз;
- трихомонадный вагинит и вульвовагинит, бактериальный вагиноз;
- смешанная вагинальная инфекция.

## Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата или другим производным нитроимидазола;
- I триместр беременности, период лактации,
- детский возраст до 18 лет;
- у девственниц.

С осторожностью: при печеночной и почечной недостаточности, порфирии, нарушении кроветворения и заболеваниях

периферической и центральной нервной системы, сахарный диабет, нарушения микроциркуляции, при беременности (II и III триместры).

## Способ применения и дозы:

Интравагинально.

*Острые вагиниты, бактериальный вагиноз:* по 1 суппозиторию утром и на ночь в течение 7 дней подряд.

*Хронические вагиниты:* по 1 суппозиторию 1 раз в сутки, непосредственно перед сном, в течение 14 дней подряд.

*Часто рецидивирующие вагиниты или при отсутствии положительной клинической динамики при лечении другими методами:* по 1 суппозиторию утром и на ночь в течение 14 дней.

Предварительно освободив суппозиторий от контурной упаковки при помощи ножниц (разрезать пленку по контуру суппозитория), ввести его глубоко во влагалище.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* жжение, зуд, раздражение слизистой оболочки влагалища и усиление отечности. Из-за воспаления слизистой оболочки влагалища при вагините раздражение может усиливаться после введения первого суппозитория или к третьему дню лечения. Эти осложнения быстро исчезают после прекращения лечения.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* боль или спазмы в животе, "металлический" привкус, сухость во рту, запор, диарея, потеря аппетита, тошнота, рвота.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, двигательные нарушения (атаксия), головокружение, психоэмоциональные нарушения, судороги.

*Со стороны системы кроветворения:* лейкопения.

*Аллергические реакции:* кожные высыпания, в том числе крапивница.

## Передозировка:

При соблюдении рекомендуемых доз, в связи с низкой абсорбцией препарата, случаи передозировки не выявлены.

Возможные симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, зуд, металлический привкус во рту, атаксия, головокружение, парестезии, периферическая невропатия (при продолжительном применении в высоких дозах), судороги, лейкопения, темное окрашивание мочи (обусловлено передозировкой метронидазола).

Симптомы передозировки миконазола не выявлены.

*Лечение:* симптоматическая и поддерживающая терапия, при случайном приеме внутрь — промывание желудка.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Назначение препарата противопоказано в I триместре беременности. Применение во II и III триместрах беременности возможно только в том случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание должно быть прекращено, так как метронидазол проникает в грудное молоко. Грудное вскармливание можно возобновить через 24-48 ч после окончания лечения.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В связи с попаданием метронидазола в системный кровоток могут отмечать следующие реакции взаимодействия при одновременном применении с некоторыми веществами:

*Пероральные антикоагулянты:* усиливается действие непрямых антикоагулянтов.

*Дисульфирам:* могут наблюдаться нарушения со стороны ЦНС (психические реакции); не, следует назначать

## **МЕТРОМИКОН-НЕО (свечи)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

метронидазол больным, которые принимали дисульфирам в течение последних 2 недель.

*Фенитоин:* повышается концентрация фенитоина в крови, а концентрация метронидазола в крови снижается.

*Препараты лития:* может наблюдаться повышение их токсичности.

*Фенобарбитал:* снижается концентрация метронидазола в крови.

*Циметидин:* может повыситься концентрация метронидазола в крови.

*Астемизол и терфенадин:* метронидазол и миконазол ингибируют метаболизм этих препаратов и повышают концентрацию в плазме крови.

*Этанол:* взаимодействие метронидазола с этанолом вызывает дисульфирамоподобные реакции.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При применении препарата следует воздерживаться от половых контактов. С целью избежания повторного инфицирования необходимо одновременное лечение полового партнера. В случае трихомонадного вагинита целесообразно одновременное лечение полового партнера метронидазолом для приема внутрь.

Во время лечения и, по крайней мере, в течение 24-48 ч после окончания курса лечения следует избегать приема этанола (возможна непереносимость этанола).

Не рекомендуется одновременное применение препарата с контрацептивными диафрагмами и презервативами из каучука или латекса (возможно взаимодействие с ценовой суппозиториями).

При сильном раздражении влагалища лечение препаратом следует прекратить.

Суппозитории следует применять только интравагинально, их нельзя проглатывать или применять другим способом.

В случае применения препарата совместно с метронидазолом для приема внутрь, особенно при повторном курсе, необходим контроль картины периферической крови (опасность лейкопении).

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами:* рекомендуется соблюдать осторожность, так как возможное, негативное влияние на способность к вождению автомашины и управлению сложными механизмами не может быть исключено. При появлении побочных эффектов со стороны центральной нервной системы следует воздержаться от управления автотранспортом и работы с потенциально опасными механизмами.

### **Условия хранения:**

В сухом защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

3 года.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/METROMIKON-NEO\\_svechi](http://drugs.thead.ru/METROMIKON-NEO_svechi)