

Маалокс Мини



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Суспензия для приема внутрь** от белого до бледно-желтого цвета, гомогенная.

	1 мини-пакет
алгелдрат (алюминия гидроксид в виде алюминия оксида гидратированного)	460 мг,
что соответствует содержанию алюминия оксида	230 мг
магния гидроксид	400 мг

Вспомогательные вещества: сахароза (раствор 64%), сорбитол жидкий (некристаллизующийся), ксантановая камедь, гуар, ароматизатор лимонно-лаймовый натуральный, натрия хлорид.

4.3 мл (6 г) - мини-пакеты (6) - пачки картонные.
4.3 мл (6 г) - мини-пакеты (10) - пачки картонные.
4.3 мл (6 г) - мини-пакеты (20) - пачки картонные.
4.3 мл (6 г) - мини-пакеты (30) - пачки картонные.
4.3 мл (6 г) - мини-пакеты (40) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидный препарат, не оказывает системного действия. Его антацидная способность равна 20 мэкв Н⁺ на мини-пакет (определение *in vitro* по методу Россета-Райса). Препарат нейтрализует свободную соляную кислоту, не вызывая вторичной гиперсекреции соляной кислоты. В связи с повышением pH при его приеме снижается пептическая активность желудочного сока. Обладает также адсорбирующим и обволакивающим действием, благодаря которым уменьшается воздействие повреждающих факторов на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки.

Маалокс мини способен устранять или ослаблять изжогу на несколько часов. Благодаря сбалансированности своего состава в отношении влияния на моторику ЖКТ Маалокс мини обычно не вызывает запора. Магния гидроксид и алгелдрат пропускают рентгеновские лучи.

Фармакокинетика

Гидроксиды магния и алюминия считаются антацидами местного действия, практически не абсорбирующимися при приеме внутрь в рекомендуемых дозах.

Показания к применению:

- изжога;
- отрыжка кислым содержимым.

Относится к болезням:

- [Изжога](#)
- [Отрыжка](#)

Противопоказания:

- почечная недостаточность тяжелой степени;
- гипофосфатемия;
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (из-за наличия в составе препарата сорбитола и сахарозы);
- детский и подростковый возраст до 15 лет;
- гиперчувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат у пациентов с нарушением функции почек (возможно повышение плазменных концентраций магния и алюминия; при длительном применении препарата Маалокс мини в высоких дозах, в т.ч. и в высоких терапевтических дозах, возможно развитие энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии); у пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе; при беременности; при болезни Альцгеймера; при низком содержании фосфатов в пище (риск развития фосфатной недостаточности); при сахарном диабете (в связи с содержанием в составе препарата сахарозы).

Способ применения и дозы:

Содержимое 1-2 мини-пакетов принимают внутрь через 1-1.5 ч после еды или при возникновении *изжоги*. При необходимости можно принять дополнительную дозу препарата через 2 ч после предыдущего приема. Максимальная суточная доза составляет 12 мини-пакетов. Курс лечения - не более 2-3 месяцев.

При эпизодическом применении, например, при *дискомфорте после погрешностей в диете*, принимают по 1-2 мини-пакета однократно.

При **почечной недостаточности легкой степени тяжести** максимальная суточная доза составляет 8 мини-пакетов. При **почечной недостаточности средней степени тяжести** максимальная суточная доза составляет 6 мини-пакетов.

Перед тем как вскрыть мини-пакет следует осторожно перемешать его содержимое, тщательно разминая пакет между пальцами. Содержимое пакета выдавить в ложку или в рот (принимать суспензию без предварительного разбавления).

Побочное действие:

При соблюдении рекомендованного режима дозирования побочные эффекты возникают редко и выражены незначительно.

Со стороны пищеварительной системы: иногда - диарея, запор, тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений.

Со стороны обмена веществ: при длительном приеме в высоких дозах (в т.ч. и терапевтических) возможны гипофосфатемия (особенно при низком содержании фосфатов в пище), гиперкальциурия, нефрокальциноз, гипокальциемия, остеопороз, остеомалация.

У пациентов с сопутствующей почечной недостаточностью: возможно повышение плазменных концентраций магния и/или алюминия, развитие жажды, снижение АД, гипорефлексия; при длительном применении в высоких дозах (в т.ч. и терапевтических) в отдельных случаях - энцефалопатия, деменция, микроцитарная анемия.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата Маалокс мини отсутствуют. Препарат практически не всасывается из ЖКТ и не

обладает системным действием, поэтому передозировка маловероятна.

Симптомы: предполагается, что вследствие передозировки возможно усиление известных побочных эффектов.

Лечение: при передозировке препаратов магния рекомендуется инфузионное введение жидкости и форсированный диурез. В случае почечной недостаточности при передозировке необходимо проведение гемодиализа или перитонеального диализа.

Применение при беременности и кормлении грудью:

На настоящий момент не выявлено никаких специфических тератогенных эффектов при применении препарата Маалокс мини при беременности, однако, в связи с недостаточностью клинического опыта, его применение при беременности возможно только в низких дозах, кратковременно и в случаях, когда потенциальная польза терапии для матери оправдывает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата Маалокс мини в период лактации прекращения грудного вскармливания не требуется.

В экспериментальных исследованиях на животных не получено четких данных на наличие тератогенного эффекта у гидроксида алюминия и гидроксида магния.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с хинидином возможно повышение сывороточных концентраций хинидина и развитие передозировки хинидина.

При одновременном приеме с препаратом Маалокс мини снижается всасывание следующих лекарственных средств из ЖКТ: ацетилсалициловая кислота (и другие салицилаты), блокаторы гистаминовых H₂-рецепторов, пропранолол, атенолол, метопролол, хлорохин, дифлунизал, дигоксин, бисфосфонаты, этамбутол, изониазид, фторхинолон, натрия фторид, ГКС (описано для преднизолона и дексаметазона), индометацин, лансопразол, линкозамиды, левотироксин натрия, кетоконазол, натрия полистиролсульфат, пеницилламин, соли железа, тетрациклины, фенотиазиновые нейролептики, фосфорсодержащие пищевые добавки, фексофенадин. В случае 2-часового интервала между приемом этих препаратов и препарата Маалокс мини и 4-часового интервала между приемом фторхинолонов и препарата Маалокс мини в большинстве случаев нежелательного взаимодействия можно избежать.

При одновременном приеме салицилатов и препарата Маалокс мини увеличивается экскреция салицилатов с мочой в результате ощелачивания мочи под влиянием препарата Маалокс мини.

При сочетании гидроксида алюминия с цитратами возможно увеличение плазменных концентраций алюминия, в особенности у пациентов с почечной недостаточностью.

Особые указания и меры предосторожности:

Если во время лечения симптомы со стороны ЖКТ сохраняются в течение более 10 дней или наблюдается ухудшение состояния, то следует уточнить диагноз и провести коррекцию лечения.

Следует соблюдать 2-часовой интервал между применением препарата Маалокс мини и других препаратов и 4-часовой интервал между приемом препарата Маалокс мини и фторхинолонов.

Следует избегать длительного назначения препарата Маалокс® мини при нарушениях функции почек. При назначении препарата Маалокс® мини пациентам с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести необходимо тщательно контролировать плазменные концентрации алюминия и магния, а в случае их повышения применение препарата должно быть немедленно прекращено.

Алгелдрат при низком содержании фосфатов в пище может приводить к развитию недостаточности фосфора в организме. Поэтому при его применении, особенно длительном, следует обеспечить достаточное поступление фосфатов с пищей.

В одном мини-пакете препарата содержится 3.15 г сахарозы и 0.2 г сорбитола, соответственно в максимальной суточной дозе содержится 37.80 г сахарозы и 2.4 г сорбитола.

Несмотря на то, что препарат отпускается без рецепта, перед применением препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания), а также у подростков старше 15 лет и пациентов с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности тяжелой степени.

С *осторожностью* следует применять препарат у пациентов с нарушением функции почек (возможно повышение плазменных концентраций магния и алюминия; при длительном применении препарата Маалокс мини в высоких дозах, в т.ч. и в высоких терапевтических дозах, возможно развитие энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии).

При **почечной недостаточности легкой степени тяжести** максимальная суточная доза составляет 8 мини-пакетов. При **почечной недостаточности средней степени тяжести** максимальная суточная доза составляет 6 мини-пакетов.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 15 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Maaloks_Mini