

## [Магалфил 800](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Магалдрат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антацидное средство. Нейтрализует хлористоводородную (солянную) кислоту в желудке и уменьшает активность пепсина. Оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие. Предотвращает влияние агрессивных факторов на слизистую оболочку желудка и усиливает ее собственные защитные механизмы, не изменяет физиологию пищеварения и не вызывает реактивную секрецию хлористоводородной кислоты.

#### **Фармакокинетика**

Абсорбция из ЖКТ низкая.

### **Показания к применению:**

Острый гастрит; хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией желудка (в фазе обострения); острый дуоденит; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения); симптоматические язвы различного генеза; эрозии слизистой оболочки ЖКТ; рефлюкс-эзофагит; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; гастралгия, изжога (после избыточного употребления этанола, никотина, кофе, приема лекарственных средств, погрешностей в диете); диспепсия невротического генеза.

### **Относится к болезням:**

- [Гастрит](#)
- [Грыжа](#)
- [Диспепсия](#)
- [Дуоденит](#)
- [Изжога](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

**Противопоказания:**

Хроническая почечная недостаточность, болезнь Альцгеймера, гипофосфатемия, беременность, повышенная чувствительность к магалдрату.

**Способ применения и дозы:**

Индивидуальный. Разовая доза составляет 0.8-1.6 г. Принимают через 1-2 ч после каждого приема пищи.

Максимальная суточная доза составляет 5.6 г.

**Побочное действие:**

Возможно: тошнота, рвота, запор, диарея.

При длительном приеме в высоких дозах возможно: гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, гипермагниемия, гипералюминиемия, энцефалопатия, нефрокальциноз, нарушение функции почек.

У больных с сопутствующей почечной недостаточностью возможно: жажда, снижение АД, снижение рефлексов.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Магальдрат противопоказан к применению при беременности.

В период лактации (грудного вскармливания) магалдрат применяют с осторожностью.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном приеме внутрь магалдрат может нарушать всасывание тетрациклинов, препаратов железа, препаратов желчных кислот, дигоксина, бензодиазепинов, дикумарола, индометацина, циметидина, изониазида, производных хинолона (ципрофлоксацина, офлоксацина, норфлоксацина).

**Особые указания и меры предосторожности:**

При длительном применении магальдрата у пациентов с нарушениями функции почек следует проводить регулярный контроль уровня алюминия в плазме крови.

С осторожностью применяют у детей в возрасте до 12 лет.

**При нарушениях функции почек**

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

При длительном применении магальдрата у пациентов с нарушениями функции почек следует проводить регулярный контроль уровня алюминия в плазме крови.

**Применение в детском возрасте**

С осторожностью применяют у детей в возрасте до 12 лет.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Magalfil\\_800](http://drugs.thead.ru/Magalfil_800)