Магний плюс

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины
- Минералы

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки шипучие***	**1 таб.**
магния карбонат	100 мг
магния лактат	200 мг
пиридоксин (вит. B_6)	2 мг
цианокобаламин (вит. B_{12})	1 мкг
фолиевая кислота	200 мкг

10 шт. - пеналы пластиковые.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Магний - жизненно важный элемент. Играет важную роль в деятельности нервной системы, участвует в регуляции передачи нервных импульсов и в сокращении мышц, в большинстве реакций обмена веществ, способствует производству и потреблению энергии, играет важную физиологическую роль в поддержании ионного баланса.

Недостаток магния проявляется в виде нервно-мышечных нарушений (бессонница, раздражительность, состояние тревоги), нарушений сердечного ритма (экстрасистолия, тахикардия) и деятельности ЖКТ (боли, диарея, спазмы, вздутие кишечника).

Витамин B_6 играет важную роль в обмене веществ, способствует нормальному функционированию нервной системы и дополняет эффект магния.

Витамин B_{12} и фолиевая кислота участвуют во многих ферментативных реакциях.

Показания к применению:

— дефицит магния и связанные с ним состояния.

Противопоказания:

— выраженная почечная недостаточноть (клиренс креатинина меньше 30 мл/мин);

— повышенная чувствиельность к компонентам препарата;

— детский возраст до 6 лет.

С осторожностью: при умеренной недостаточности функции почек, так как существует риск развития гипермагниемии.

Способ применения и дозы:

Взрослые: по 1-2 таб. **Дети от 6 до 12 лет** - 1/2 таб.

Принимать в первой половине дня, предварительно растворив в стакане воды.

Побочное действие:

Аллергические реакции, диспептические расстройства (диарея, боли в животе). При применении в повышенных дозах возможно развитие гипермагниемии.

Передозировка:

Симптомы передозировки: падение АД, тошнота, рвота, замедление рефлексов, угнетение дыхания, кома, остановка сердца и паралич сердца, анурия.

Лечение: регидратация, форсированный диурез. При почечечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат может применяться в период беременности только по назначению врача.

Магний проникает в грудное молоко, поэтому следует избегать применения препарата в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фосфаты и соли кальция уменьшают всасывание магния в ЖКТ.

Препараты магния снижают всасывание тетрациклина; рекомендуется делать интервал 3 ч перед применением Магний Плюс.

Витамин B_6 угнетает активность леводопы.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае сопутствующего дефицита кальция, дефицит магния должет быть устранен до начала введения дополнительного приема кальция. При частом употреблении слабительных средств, алкоголя, повышенных физических и психических нагрузках потребность в магнии возрастает.

При нарушениях функции почек

Противопоказание - выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина меньше 30 мл/мин).

Применение в детском возрасте

Противопоказан **детям до 6 лет**. **Дети от 6 до 12 лет** - 1/2 таблетки.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат после даты, указанной на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Magniy_plyus