

Макмирор



Код АТХ:

- [G01AX05](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нифурател](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой (сахарной) белого цвета, двояковыпуклые.

	1 таб.
нифурател	200 мг

Вспомогательные вещества: крахмал, полиэтиленгликоль 6000, тальк, магния стеарат, желатин, гуммиарабик, сахароза, магния карбонат, титана диоксид, Е воск.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробный препарат широкого спектра действия, производное нитрофурана. Оказывает антибактериальное, противопротозойное и противогрибковое действие. Нифурател обладает высокой эффективностью и низкой

токсичностью, что обуславливает широкий спектр его клинического применения.

Высокоэффективен в отношении *Papiliobacter* и *Helicobacter pylori* (особенно в отношении штаммов *Helicobacter pylori*, устойчивых к метронидазолу), грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: при МПК 12.5-25 мкг/мл подавляет от 44.3 до 93.2% культур.

Препарат *активен в отношении* *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Shigella flexneri* 2a, *Shigella flexneri* 6, *Shigella sonnei*, *Salmonella typhi*, *Salmonella typhimurium*, *Salmonella enteridis*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Serratia* spp., *Citrobacter* spp., *Morganella* spp., *Retterella* spp., *Pragia fontium*, *Budvicia aquatica*, *Rachnella aquatilis* и *Acinetobacter* spp., прочих атипичных энтеробактерий, а также простейших (амебы, лямблии); менее активен в отношении *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Prseudomonas aeruginosa*.

Является препаратом выбора для терапии бактериальных кишечных инфекций, в т.ч. сальмонеллезов, шигеллезов.

Активен в отношении *Trichomonas vaginalis*; *высокоактивен в отношении* грибов рода *Candida*.

Полностью выводится из организма почками, оказывая сильное антибактериальное действие в мочевыводящем тракте.

Фармакокинетика

После приема препарата внутрь нифурател быстро абсорбируется из ЖКТ. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьеры, выделяется с грудным молоком. Метаболизируется в печени и в мышечной ткани. Полностью выводится с мочой (30-50% в неизменном виде).

Показания к применению:

- хронические воспалительные заболевания верхних отделов ЖКТ, ассоциированные с *Helicobacter pylori*;
- кишечный амебиаз;
- лямблиоз;
- вульвовагинальные инфекции, вызванные чувствительными к препарату возбудителями (трихомонады, хламидии, грибы рода *Candida*, бактерии);
- инфекции мочевыводящих путей, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами (в т.ч. пиелонефрит, уретрит, цистит, пиелит).

Относится к болезням:

- [Амебиаз](#)
- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)
- [Инфекции мочевыводящих путей](#)
- [Пиелит](#)
- [Уретрит](#)
- [Цистит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *инфекциях, вызванных Helicobacter pylori*, **взрослым** Макмирор назначают по 400 мг (2 таб.) 2-3 раза/сут; **детям** рекомендуемая доза определяется из расчета по 15 мг/кг массы тела 2 раза/сут. Продолжительность приема - 7 дней.

При *кишечном амебиазе* **взрослым** назначают по 400 мг (2 таб.) 2-3 раза/сут в течение 10 дней. Для **детей** рекомендуемая доза составляет 10 мг/кг 3 раза/сут.

При *лямблиозе* **взрослым** назначают по 400 мг (2 таб.) 2-3 раза/сут; **детям** - в дозе из расчета по 15 мг/кг 2 раза/сут. Продолжительность приема - 7 дней.

При *инфекциях мочевыводящих путей* **взрослым** в зависимости от тяжести заболевания препарат назначают по

Макмирор

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

600-1200 мг (3-6 таб.)/сут в течение 7-14 дней. Для **детей** рекомендуемая доза составляет 30-60 мг/кг/сут в 2 приема. По рекомендации врача курс лечения может быть продлен или повторен.

При *вагинальных инфекциях* **взрослым** по 200 мг (1 таб.) 3 раза/сут в течение 7 дней (принимать препарат должны оба половых партнера). Для **детей** рекомендуемая суточная доза составляет 10 мг/кг/сут в 2 приема ежедневно в течение 10 дней.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, горечь во рту, диарея, изжога, гастралгия.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки препарата Макмирор не отмечено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности возможно только по строгим показаниям, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, т.к. нифурател проникает через плацентарный барьер.

При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания, т.к. нифурател выделяется с грудным молоком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Макмирор усиливает противогрибковое действие нистатина при совместном применении.

Особые указания и меры предосторожности:

При лечении вагинальных инфекций только препаратом Макмирор для приема внутрь рекомендуется увеличить дозу данного препарата до 800-1200 мг/сут (4-6 таб.). В период лечения следует воздерживаться от половых контактов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Отрицательного воздействия не выявлено.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Makmiror>