

## Макмирор комплекс



### Код АТХ:

- [G01AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нистатин](#)
- [Нифурател](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Суппозитории вагинальные** мягкие желатиновые, яйцевидной формы, желтого цвета с коричневым оттенком; содержимое суппозитория - маслянистая суспензия желтого цвета.

|           |                |
|-----------|----------------|
|           | <b>1 супп.</b> |
| нифурател | 500 мг         |
| нистатин  | 200 тыс.МЕ     |

*Вспомогательные вещества:* диметилполисилоксан АК 1000 (диметикон).

*Состав оболочки:* желатин, глицерол, этилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, титана диоксид, железа оксид желтый.

8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

**Крем вагинальный** жидкий, гомогенный, желтого цвета.

|           |            |
|-----------|------------|
|           | <b>1 г</b> |
| нифурател | 100 мг     |
| нистатин  | 40 тыс.МЕ  |

*Вспомогательные вещества:* ксалифин 15, метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, глицерол, сорбитола 70% раствор, пропиленгликоль, карбомер, триэтаноламин 30%, вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликатором (градуированным шприцем) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

**Фармакодинамика**

Противомикробный препарат для местного применения. Оказывает противопротозойное, противогрибковое и антибактериальное действие.

Нифурател - производное нитрофурана - *высокоактивен в отношении* ряда бактерий, грибов и простейших (в т.ч. *Trichomonas vaginalis*).

Нистатин - противогрибковый антибиотик группы полиенов. Связываясь со стеролами в клеточной мембране грибов, нарушает ее проницаемость, что приводит к гибели клетки. *Высокоактивен в отношении* *Candida albicans*.

Комбинация нифуратела и нистатина позволяет достичь более выраженного противогрибкового действия и значительно расширить спектр противомикробного действия. Высокая эффективность и низкая токсичность компонентов препарата обуславливают широкий спектр его клинического применения в лечении вагинитов смешанной этиологии, в частности, использование для профилактики микозов, вызванных специфическим лечением трихомониаза.

Макмирор комплекс не нарушает физиологическую флору, что позволяет избежать развития дисбактериоза и быстро восстановить нормоценоз влагалища.

**Показания к применению:**

— комплексная терапия вульвовагинальных инфекций, вызванных чувствительными к препарату возбудителями: бактериями, трихомонадами, грибами рода *Candida* и хламидиями.

**Относится к болезням:**

- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)

**Противопоказания:**

— повышенная чувствительность к одному из активных ингредиентов или какому-либо вспомогательному ингредиенту препарата.

**Способ применения и дозы:**

Препарат предназначен для местного применения при гинекологических или венерических заболеваниях.

*Суппозитории вагинальные*

1 вагинальный суппозиторий вводят ежедневно вечером перед сном в течение 8 дней либо в соответствии с рекомендациями врача. При необходимости лечение можно повторить после менструации.

Для достижения максимального терапевтического эффекта суппозиторий следует вводить в верхнюю часть влагалища.

Суппозитории не применяют для лечения у детей. Данной категории пациентов рекомендуется применять крем вагинальный в комплекте с аппликатором (градуированным шприцем).

*Крем вагинальный*

Назначают 2.5 г крема 1-2 раза/сут (утром или вечером) в течение 8 дней.

Необходимую дозу крема следует вводить при помощи градуированного аппликатора.

**Инструкция по применению градуированного аппликатора**

Навинтить градуированный аппликатор к тюбику с кремом. Набрать необходимое количество крема (в соответствии с линиями шкалы, обозначающими количество в граммах), надавливая на тюбик. Отсоединить от тюбика, ввести во влагалище, выдавить содержимое аппликатора, надавливая на стержень.

Наличие специальной насадки позволяет ввести крем, не повреждая девственную плеву. Для этого необходимо извлечь канюлю из верхней части стержня и навинтить на головку шприца с противоположной стороны, прежде чем вводить крем во влагалище.

## **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* редко - кожная сыпь, зуд.

## **Передозировка:**

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Какие-либо противопоказания к применению препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) отсутствуют.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Макмирор комплекс с другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Необходимо провести одновременное лечение полового партнера из-за опасности повторного заражения. В период лечения препаратом следует избегать половых контактов.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Применение препарата не влияет на способность управлять автотранспортом, заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## **Условия хранения:**

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Makmiror\\_Kompleks](http://drugs.thead.ru/Makmiror_Kompleks)