

Макмирор комплекс (свечи)



Код АТХ:

- [G01AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нистатин](#)
- [Нифурател](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории вагинальные мягкие желатиновые, яйцевидной формы, желтого цвета с коричневым оттенком; содержимое суппозитория - маслянистая суспензия желтого цвета.

	1 супп.
нифурател	500 мг
нистатин	200 тыс. МЕ

Вспомогательные вещества: диметилполисилоксан АК 1000 (диметикон) 960.0 мг.

Состав оболочки: желатин 351.0 мг, глицерин (глицерол) 171.0 мг, этилпарагидроксibenзоат натрия 1.8 мг, пропилпарагидроксibenзоат натрия 1.0 мг, титана диоксид 0.4 мг, железа оксид желтый 2.4 мг

8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное, противогрибковое, противопротозойное.

Фармакодинамика

Активен в отношении *Trichomonas vaginalis* и грибов рода *Candida*, простейших, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Показания к применению:

— вульвовагинальные инфекции, вызванные чувствительными к препарату возбудителями: в т.ч. бактериальный вагинит, трихомониаз влагалища; вагинит, вызванный грибами рода *Candida*, смешанные вагиниты.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)
- [Трихомониаз](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность к нифурателу, нистатину или какому-либо вспомогательному веществу препарата;

— детский возраст.

Способ применения и дозы:

Интравагинально: 1 вагинальный суппозиторий вводится ежедневно вечером перед сном в течение 8 дней либо в соответствии с рекомендациями врача. При необходимости лечение можно повторить после менструации.

Для достижения максимального эффекта суппозиторий вводят глубоко во влагалище.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции в виде кожной сыпи или зуда. При развитии аллергических реакций применение препарата необходимо прекратить.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности возможно, если потенциальная польза для матери превышает риск для плода или ребенка.

Возможно применение в период грудного вскармливания, т.к. препарат практически не всасывается через слизистые оболочки, поэтому в грудное молоко не проникает.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия крема Макмирор Комплекс с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо провести одновременное лечение полового партнера из-за опасности повторного заражения. В период лечения препаратом следует избегать половых контактов.

Суппозитории не применяют для лечения в детском возрасте, при необходимости применения препарата у данной категории пациентов, рекомендуется применять препарат Макмирор Комплекс в лекарственной форме крем вагинальный в комплекте с аппликатором (градуированным шприцем). Наличие специальной насадки позволяет ввести крем, не повреждая девственную плеву.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и иную деятельность, требующую повышенного внимания.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Makmiror_kompleks_svechi