Макровит



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, допускаются вкрапления.

	1 таб.
ретинола пальмитат (вит. А) синтетический	0.88 мг
α-токоферола ацетат (вит. Е)	5 мг
колекальциферол (вит. D_3) (концентрат, масляная форма)	0.1 мг
аскорбиновая кислота (вит. С)	80 мг
тиамина мононитрат (вит. B_1)	0.5 мг
рибофлавин (вит. B_2)	0.6 мг
кальция пантотенат (вит. B_5)	5 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	1 мг
цианокобаламин (вит. B_{12}) 0.1% в маннитоле	2 мг
никотинамид (вит. РР)	5 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, декстроза жидкая (сухое вещество), сорбитол, ароматизаторы мандариновый 61105, персиковый 78123-33, полисорбат 80, глицерол, касторовое масло, магния стеарат, краситель солнечный закат желтый (Е110), титана диоксид (Е171), повидон, воск эмульсионный, пеногаситель 1510, сахароза.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (100) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитамины. Макровит содержит комплекс витаминов, которые участвуют в многочисленных биохимических процессах организма.

Витамины группы В (B_1 /тиамин/, B_2 /рибофлавин/, B_5 /пантотеновая кислота/, B_6 /пиридоксин/и Р /никотинамид/) участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров, обмене эритроцитов и синтезе нейромедиаторов.

Витамин А (ретинол) необходим для биосинтеза светочувствительного пигмента сетчатки глаза.

Витамин D (колекальциферол) регулирует усвоение кальция.

Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует абсорбции железа и участвует во многих окислительно-

восстановительных процессах в организме.

Витамин Е (токоферол) является физиологическим антиоксидантом, защищающим мембраны клеток от повреждения, и сохраняет их функциональную активность.

Показания к применению:

Повышенная потребность в витаминах:

— при повышенных физических и/или умственных нагрузках;

— в период интенсивных занятий спортом;

— при нерегулярном и несбалансированном питании (в т.ч. при соблюдении диет, в период сезонного недостатка свежих овощей и фруктов, а также на фоне сниженного аппетита у людей пожилого возраста, у людей с никотиновой и алкогольной зависимостью);

— при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказания:

— гипервитаминоз A и D;

— детский возраст до 6 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат не следует принимать пациентам с синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы, дефицитом лактазы или сахаразы/изомальтазы и врожденной непереносимостью фруктозы.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь, после еды.Таблетки следует держать во рту до полного растворения или разжевывать.

Детям в возрасте от 6 до 10 лет назначают по 1 таб. 1-2 раза/сут; **взрослым и детям в возрасте старше 10 лет** - по 1 таб. 2-3 раза/сут.

Курс лечения - 20-30 дней. Повторный курс возможен по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Длительное применение препарата в больших дозах может привести к гипервитаминозу A и D.

Макровит содержит глицерол, который в высоких дозах может вызывать головную боль, нарушения со стороны пищеварительной системы (диарея).

Пациента следует информировать о том, что в случае возникновения аллергических реакций, необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

Продолжительный прием препарата в очень высоких дозах может привести к гипервитаминозу витаминов A и D, однако вероятность передозировки препарата Макровит минимальна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания прием препарата Макровит возможен только по рекомендации врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с другими поливитаминными комплексами во избежание передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Прием препарата у детей в возрасте до 14 лет возможен только по рекомендации врача.

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.

Макровит содержит азокраситель Е 110, который может вызвать реакцию повышенной чувствительности с астматическим компонентом. Подобные реакции чаще отмечаются у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что является безвредным и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Макровит содержит глицерол, который может вызывать головную боль, а также желудочно-кишечную диспепсию.

Макровит содержит полиол, который в некоторых случаях может вызывать диарею.

Больные сахарным диабетом могут принимать препарат Макровит, но следует учитывать, что 1 таблетка содержит 610 мг сахарозы и 150 мг глюкозы, а суточная доза - 0.61-1.8 г сахарозы и 0.15-0.45 г глюкозы.

В препарате содержится 187 мг лактозы, 614 мг сахарозы, 150 мг глюкозы и 131 мг сорбитола, поэтому препарат не рекомендуется детям с врожденной непереносимостью глюкозы и фруктозы, с синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы и дефицитом сахаразы/изомальтазы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

О неблагоприятном влиянии Макровита на способность управлять автомобилем и работу с механизмами не сообщалось.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом и защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Makrovit