

Максамин форте



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)
- [Минералы](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой** красного цвета, круглые, двояковыпуклые, хорошо отполированные; на изломе - ядро темно-желтого цвета с белыми и буро-зелеными вкраплениями, два слоя оболочки (белого и красного цвета).

| | 1 таб. |
|--|---------------|
| ретинола ацетат (вит. А) | 10 тыс. МЕ |
| токоферола ацетат (вит. Е) | 15 мг |
| колекальциферол (вит. D ₃) | 1 тыс. МЕ |
| аскорбиновая кислота (вит. С) | 150 мг |
| тиамина мононитрат (вит. В ₁) | 10 мг |
| рибофлавин (вит. В ₂) | 10 мг |
| кальция пантотенат (вит. В ₅) | 10 мг |
| пиридоксина гидрохлорид (вит. В ₆) | 3 мг |
| фолиевая кислота (вит. В ₉) | 1.5 мг |
| цианокобаламин (вит. В ₁₂) | 15 мкг |
| никотинамид (вит. РР) | 45 мг |
| кальций (в форме фосфата) | 51.3 мг |
| магний (в форме оксида) | 33.16 мг |
| железо (в форме сульфата) | 32 мг |
| медь (в форме сульфата) | 3.93 мг |
| цинк (в форме сульфата) | 50 мг |
| марганец (в форме сульфата) | 4.06 мг |

Вспомогательные вещества: повидон - 20 мг, магния стеарат - 2.66 мг, тальк - 40.875 мг, крахмал - 6.66 мг.

Состав оболочки: этилцеллюлоза - 20 мг, тальк - 40.875 мг, акации порошок - 10.416 мг, сахара - 126 мг, каолин светлый - 45 мг, титана диоксид - 21.66 мг, крахмал - 6.66 мг, парафин светлый жидкий - 0.066 мг, парафин твердый - 0.166 мг, краситель Понсо 4R - 0.3625 мг.

10 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий витамины и минералы. Действие обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов.

Показания к применению:

- при гипо- и авитаминозах;
- при несбалансированном и неполноценном питании;
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период восстановления после перенесенных заболеваний;
- в послеоперационном периоде.

Противопоказания:

- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Принимать по 1 таб./сут. Курс лечения по назначению врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Максамина форте и эстрогенсодержащих контрацептивов усиливается действие ретинола.

При одновременном применении Максамина форте и тетрациклинов усиливается всасывание ретинола в кишечнике и повышается его концентрация в печени и в тканях.

При одновременном применении Максамина форте и колестирамина снижается всасывание колекальциферола и ретинола.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминно-минеральных комплексов (во избежании передозировки).

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре 15-25°C в сухом месте. Хранить в местах, недоступных для детей. Не использовать позже срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Maksamin_forte