

## Максамин форте



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)
- [Минералы](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой** красного цвета, круглые, двояковыпуклые, хорошо отполированные; на изломе - ядро темно-желтого цвета с белыми и буро-зелеными вкраплениями, два слоя оболочки (белого и красного цвета).

	<b>1 таб.</b>
ретинола ацетат (вит. А)	10 тыс. МЕ
токоферола ацетат (вит. Е)	15 мг
колекальциферол (вит. D <sub>3</sub> )	1 тыс. МЕ
аскорбиновая кислота (вит. С)	150 мг
тиамина мононитрат (вит. В <sub>1</sub> )	10 мг
рибофлавин (вит. В <sub>2</sub> )	10 мг
кальция пантотенат (вит. В <sub>5</sub> )	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В <sub>6</sub> )	3 мг
фолиевая кислота (вит. В <sub>9</sub> )	1.5 мг
цианокобаламин (вит. В <sub>12</sub> )	15 мкг
никотинамид (вит. РР)	45 мг
кальций (в форме фосфата)	51.3 мг
магний (в форме оксида)	33.16 мг
железо (в форме сульфата)	32 мг
медь (в форме сульфата)	3.93 мг
цинк (в форме сульфата)	50 мг
марганец (в форме сульфата)	4.06 мг

*Вспомогательные вещества:* повидон - 20 мг, магния стеарат - 2.66 мг, тальк - 40.875 мг, крахмал - 6.66 мг.

*Состав оболочки:* этилцеллюлоза - 20 мг, тальк - 40.875 мг, акации порошок - 10.416 мг, сахара - 126 мг, каолин светлый - 45 мг, титана диоксид - 21.66 мг, крахмал - 6.66 мг, парафин светлый жидкий - 0.066 мг, парафин твердый - 0.166 мг, краситель Понсо 4R - 0.3625 мг.

10 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (10) - пачки картонные.

## **Фармакологические свойства:**

### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, содержащий витамины и минералы. Действие обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов.

## **Показания к применению:**

- при гипо- и авитаминозах;
- при несбалансированном и неполноценном питании;
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период восстановления после перенесенных заболеваний;
- в послеоперационном периоде.

## **Противопоказания:**

- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Принимать по 1 таб./сут. Курс лечения по назначению врача.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении Максамина форте и эстрогенсодержащих контрацептивов усиливается действие ретинола.

При одновременном применении Максамина форте и тетрациклинов усиливается всасывание ретинола в кишечнике и повышается его концентрация в печени и в тканях.

При одновременном применении Максамина форте и колестирамина снижается всасывание колекальциферола и ретинола.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминно-минеральных комплексов (во избежании передозировки).

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям.

**Условия хранения:**

Препарат хранить при температуре 15-25°C в сухом месте. Хранить в местах, недоступных для детей. Не использовать позже срока годности, указанного на упаковке.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Maksamin\\_forte](http://drugs.thead.ru/Maksamin_forte)