# Максамин форте




## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины
- Минералы

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** красного цвета, круглые, двояковыпуклые, хорошо отполированные; на изломе - ядро темно-желтого цвета с белыми и буро-зелеными вкраплениями, два слоя оболочки (белого и красного цвета).

| | **1 таб.** |
|---|---|
| ретинола ацетат (вит. A) | 10 тыс. МЕ |
| токоферола ацетат (вит. E) | 15 мг |
| колекальциферол (вит. $D_3$) | 1 тыс. МЕ |
| аскорбиновая кислота (вит. C) | 150 мг |
| тиамина мононитрат (вит. $B_1$) | 10 мг |
| рибофлавин (вит. $B_2$) | 10 мг |
| кальция пантотенат (вит. $B_5$) | 10 мг |
| пиридоксина гидрохлорид (вит. $B_6$) | 3 мг |
| фолиевая кислота (вит. $B_c$) | 1.5 мг |
| цианокобаламин (вит. $B_{12}$) | 15 мкг |
| никотинамид (вит. PP) | 45 мг |
| кальций (в форме фосфата) | 51.3 мг |
| магний (в форме оксида) | 33.16 мг |
| железо (в форме сульфата) | 32 мг |
| медь (в форме сульфата) | 3.93 мг |
| цинк (в форме сульфата) | 50 мг |
| марганец (в форме сульфата) | 4.06 мг |

*Вспомогательные вещества:* повидон - 20 мг, магния стеарат - 2.66 мг, тальк - 40.875 мг, крахмал - 6.66 мг.

*Состав оболочки:* этилцеллюлоза - 20 мг, тальк - 40.875 мг, акации порошок - 10.416 мг, сукроза - 126 мг, каолин светлый - 45 мг, титана диоксид - 21.66 мг, крахмал - 6.66 мг, парафин светлый жидкий - 0.066 мг, парафин твердый - 0.166 мг, краситель Понсо 4R - 0.3625 мг.

10 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (10) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, содержащий витамины и минералы. Действие обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов.

## Показания к применению:

— при гипо- и авитаминозах;

— при несбалансированном и неполноценном питании;

— при повышенных физических и умственных нагрузках;

— в период восстановления после перенесенных заболеваний;

— в послеоперационном периоде.

## Противопоказания:

— детский возраст;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Принимать по 1 таб./сут. Курс лечения по назначению врача.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Максамина форте и эстрогенсодержащих контрацептивов усиливается действие ретинола.

При одновременном применении Максамина форте и тетрациклинов усиливается всасывание ретинола в кишечнике и повышается его концентрация в печени и в тканях.

При одновременном применении Максамина форте и колестирамина снижается всасывание колекальциферола и ретинола.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминно-минеральных комплексов (во избежании передозировки).

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям.

## Условия хранения:

Препарат хранить при температуре 15-25°C в сухом месте. Хранить в местах, недоступных для детей. Не использовать позже срока годности, указанного на упаковке.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Maksamin_forte