Максиколд Ототита



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Капли ушные*** прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость с характерным запахом.

	1 г
феназон	40 мг
лидокаина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: натрия тиосульфат (натрия тиосульфата пентагидрат) - 1 мл, этанол (спирт этиловый 95%) - 221.8 мг, вода очищенная - 18.2 мг, натрия гидроксида раствор 1М - до pH 5.5 ± 0.2, глицерол - до 1 г.

15 мл - флаконы-капельницы (1) с насадкой-дозатором - пачки картонные.
15 мл - флакон темного стекла (1) с пробкой-капельницей - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное лекарственное средство, оказывает противовоспалительное, местноанестезирующее и анальгезирующее действие.

Показания к применению:

Для местного симптоматического лечения и обезболивания у взрослых и детей (включая новорожденных) при: среднем отите в остром периоде в момент воспаления; отите, как осложнении после гриппа; баротравматическом отите.

Относится к болезням:

- Воспаление
- Грипп
- Отит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам комбинации; механическое повреждение барабанной перепонки.

Способ применения и дозы:

В наружный слуховой проход по 4 кап. 2-3 раза/сут. Курс лечения не должен превышать 10 сут.

Побочное действие:

Местные реакции: аллергические реакции, раздражение, гиперемия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям и при условии неповрежденной барабанной перепонки.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Ангина
- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха

Источник: http://drugs.thead.ru/Maksikold_Ototita