

Максиколд Ототита



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Капли ушные** прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость с характерным запахом.

	1 г
феназон	40 мг
лидокаина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: натрия тиосульфат (натрия тиосульфата пентагидрат) - 1 мл, этанол (спирт этиловый 95%) - 221.8 мг, вода очищенная - 18.2 мг, натрия гидроксида раствор 1M - до pH 5.5 ± 0.2, глицерол - до 1 г.

15 мл - флаконы-капельницы (1) с насадкой-дозатором - пачки картонные.

15 мл - флакон темного стекла (1) с пробкой-капельницей - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное лекарственное средство, оказывает противовоспалительное, местноанестезирующее и анальгезирующее действие.

Показания к применению:

Для местного симптоматического лечения и обезболивания у взрослых и детей (включая новорожденных) при: среднем отите в остром периоде в момент воспаления; отите, как осложнении после гриппа; баротравматическом отите.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Грипп](#)
- [Отит](#)

Противопоказания:

Максиколд Ототита

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Повышенная чувствительность к компонентам комбинации; механическое повреждение барабанной перепонки.

Способ применения и дозы:

В наружный слуховой проход по 4 кап. 2-3 раза/сут. Курс лечения не должен превышать 10 сут.

Побочное действие:

Местные реакции: аллергические реакции, раздражение, гиперемия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям и при условии неповрежденной барабанной перепонки.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Ангина
- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха

Источник: http://drugs.thead.ru/Maksikold_Ototita