

Маммолептин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы	1 капс.
порошок рогов благородного оленя	89.1 мг
порошок корня норичника нингпонского	59.4 мг
порошок корней женьшеня ложного	59.4 мг
порошок сухого экстракта смеси растительного сырья*	112.1 мг

*- для получения 112.1 мг смеси используется 792.7 мг смеси сырья: корень трихозанта Кирилова, трихозанта Ростхорна 27.8 мг, корень пиона молочноцветкового, пиона Уича 17.8 мг, корень аукландии лопухолистной -47.5 мг, плоды форсатии повислой - 23.8 мг, одуванчика монгольского надземная часть - 59.4 мг, стебель спатолобуса - 59.4 мг, саргассовая водоросль высушенная - 115.8 мг, сафлора красильного бутоны - 35.6 мг, слоевище ламинарии японской -231.5 мг, корень мордовника даурского - 35.6 мг, корень пиона полукустарникового 83.1 мг, колос черноголовки обыкновенной - 59.4 мг

60 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, фармакологическое действие которого обусловлено совокупностью свойств входящих в его состав компонентов. Оказывает противовоспалительное, противоотечное, анальгезирующее действие. Курсовое применение препарата способствует уменьшению интенсивности и исчезновению болевого синдрома, что сопровождается регрессом структурных изменений ткани молочной железы, обусловленных диффузной фиброзно-кистозной мастопатией.

Показания к применению:

- масталгия;
- диффузная фиброзно-кистозная мастопатия.

Относится к болезням:

- [Мастит](#)
- [Мастопатия](#)

- [Фиброз](#)
- [Фиброма](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период лактации;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутри **взрослым** по 5 капсул 3 раза/сут через 30-60 мин после еды. Курс лечения 2 месяца. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения определяется лечащим врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, в редких случаях - кратковременно давящие боли в области эпигастрия, изжога, отрыжка, сухость во рту.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат следует принимать после назначения и под контролем врача.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от света месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

