

## Мамоклам



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Таблетки, покрытые оболочкой** светло-зеленого цвета, двояковыпуклые.

	<b>1 таб.</b>
субстанция "Клам"	100 мг
в т.ч. липиды	не менее 40 мг,
йод (в органически связанной форме)	не менее 100 мкг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, сахар рафинированный, крахмал картофельный, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, магния карбонат, кальция стеарат, метилцеллюлоза, титана диоксид пигментный марки А, твин-80.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные.  
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.  
20 шт. - банки темного стекла.  
20 шт. - упаковки ячейковые контурные.  
30 шт. - банки темного стекла.  
40 шт. - банки полимерные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Метаболики](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Препарат, содержащий биологически активные компоненты. Мамоклам оказывает лечебный эффект при фиброзно-кистозной мастопатии. Уменьшает проявления масталгии, приводит к регрессии кист, нормализует процессы пролиферации эпителия молочных желез. Уменьшает проявления синдрома предменструального напряжения.

**Фармакокинетика**

Действие препарата Мамоклам является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

**Показания к применению:**

— лечение фиброзно-кистозной мастопатии.

**Относится к болезням:**

- [Фиброз](#)
- [Фиброма](#)

**Противопоказания:**

- заболевания почек;
- гиперфункция щитовидной железы;
- многоузловой зоб;
- тиреотоксикоз различного генеза;
- беременность;
- период лактации (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Назначают внутрь до еды по 1-2 таб. 2-3 раза/сут с равными промежутками времени в течение дня, суточная доза - 3-6 таб. Продолжительность курса лечения - 1 месяц. При необходимости рекомендуется повторение курса лечения с интервалом от 2 недель до 3 месяцев.

**Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* кожный зуд, покраснение кожи, высыпания.

*Со стороны пищеварительной системы:* изжога, метеоризм, диарея.

**Передозировка:**

Явлений передозировки при применении Мамоклама не выявлено.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При применении Мамоклама в терапевтических дозах в организм поступает йод в количестве, в несколько раз превышающем его рекомендуемую физиологическую дозу, поэтому Мамоклам не следует назначать с препаратами, содержащими йод.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при заболеваниях почек.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 5° до 20°С.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Mamoklam>