Мамоклам



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой светло-зеленого цвета, двояковыпуклые.

	1 таб.
субстанция "Клам"	100 мг
в т.ч. липиды	не менее 40 мг,
йод (в органически связанной форме)	не менее 100 мкг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, сахар рафинированный, крахмал картофельный, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, магния карбонат, кальция стеарат, метилцеллюлоза, титана диоксид пигментный марки А, твин-80.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
20 шт. - банки темного стекла.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные.
30 шт. - банки темного стекла.
40 шт. - банки полимерные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, содержащий биологически активные компоненты. Мамоклам оказывает лечебный эффект при фиброзно-кистозной мастопатии. Уменьшает проявления масталгии, приводит к регрессии кист, нормализует процессы пролиферации эпителия молочных желез. Уменьшает проявления синдрома предменструального напряжения.

Фармакокинетика

Действие препарата Мамоклам является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

— лечение фиброзно-кистозной мастопатии.

Относится к болезням:

- Фиброз
- Фиброма

Противопоказания:

— заболевания почек;

— гиперфункция щитовидной железы;

— многоузловой зоб;

— тиреотоксикоз различного генеза;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь до еды по 1-2 таб. 2-3 раза/сут с равными промежутками времени в течение дня, суточная доза - 3-6 таб. Продолжительность курса лечения - 1 месяц. При необходимости рекомендуется повторение курса лечения с интервалом от 2 недель до 3 месяцев.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожный зуд, покраснение кожи, высыпания.

Со стороны пищеварительной системы: изжога, метеоризм, диарея.

Передозировка:

Явлений передозировки при применении Мамоклама не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении Мамоклама в терапевтических дозах в организм поступает йод в количестве, в несколько раз превышающем его рекомендуемую физиологическую дозу, поэтому Мамоклам не следует назначать с препаратами, содержащими йод.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при заболеваниях почек.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 5° до 20°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mamoklam