Мардил Цинк



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для местного применения	**1 мл**
цинка 2-хлорпропионата раствор 1.5% в 2-хлорпропионовой кислоте	0.3 мл

1 мл - флаконы темного стекла (1) - контейнеры из пенопласта (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Мардил Цинк представляет собой 30% водный раствор хлорпропионата цинка и 2-хлорпропионовой кислоты. При местном применении на пораженных участках слизистой оболочки Мардил Цинк способен прерывать рост и жизнедеятельность патологически измененных клеток и тканей, в т.ч. доброкачественных новообразований слизистой оболочки, посредством антиокоагуляции, дегидратации и девитализации. При местном применении на пораженных участках слизистой оболочки препарат ведет к фиксации с последующей некротизацией патологически измененной ткани. Непосредственное действие препарата выражается в обесцвечивании слизистой оболочки с появлением характерного бледно-серого оттенка. При нанесении препарата на эктопический цилиндрический эпителий (цервикальная эктопия и зона трансформации) происходит их коагуляция и девитализация. При этом неповрежденный многослойный плоский эпителий влагалищной части шейки матки и слизистой оболочки влагалища, являющийся более резистентным к воздействию препарата Мардил Цинк, остается практически неповрежденным. Заживление идет без осложнений при отсутствии вторичной инфекции, не оставляет рубцов, деформаций прилегающих тканей и нарушений функций органов.

Фармакокинетика

При нанесении на пораженные участки слизистой оболочки Мардил Цинк не всасывается и системного воздействия на организм не оказывает.

Показания к применению:

Для местного лечения доброкачественных образований слизистых оболочек влагалища и шейки матки:

— аногенитальных бородавок;

— эктопии шейки матки.

Относится к болезням:

- Бородавки

Противопоказания:

— злокачественные новообразования шейки матки, влагалища и аногенитальных зон;

— цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN);

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Лечение эктопии

Перед проведением процедуры обязательно онкоцитологическое исследование мазков-отпечатков. Процедура должна проводиться специалистом гинекологом или дерматовенерологом с использованием кольпоскопа. Препарат следует наносить только на измененную ткань, избегая попадания раствора на здоровую слизистую оболочку. Перед лечебной процедурой необходимо подготовить влагалище и шейку матки, удалив ватным тампоном вагинальную слизь. Аппликацию проводят однократно универсальным зондом или аппликатором. Эффект проявляется в виде появления беловато-желтой окраски ткани. В последующем отмечается уменьшение струпа и его отторжение. Длительность эпителизации зависит от размера эктопии и может составлять от 2 до 6 недель. Количество наносимого препарата зависит от площади поражения и может варьировать 0.02-0.2 мл.

Максимальная суточная доза не должна превышать 0.2 мл.

Лечение аногенитальных бородавок

Лечение проводится в амбулаторных условиях под наблюдением врача. Процедура не требует анестезии. Препарат наносят зондом универсальным или аппликатором. После нанесения препарата происходит изменение окраски тканей до беловато-серого цвета. Количество аппликаций и объем наносимого препарата зависят от размеров образования и площади поражения слизистой оболочки и может составлять 0.02 мл-0.2 мл.

Максимальная суточная доза не должна превышать 0.2 мл.

При наличии обширных очагов поражения лечение препаратом должно проводиться в несколько этапов с интервалом не менее 24 ч. Во время каждой процедуры может быть обработано не более 2-3 очагов поражения суммарной площадью до 3 $см^2$.

При нанесении препарата Мардил Цинк возникает небольшой отек слизистой оболочки. В течение 2-3 сут после использования препарата происходит отторжение некротизированных тканей.

Полная регенерация наблюдается в течение 10-14 сут.

При крупных аногенитальных бородавках в случае неполной некротизации возможно повторное нанесение препарата через 5-7 сут.

Побочное действие:

Возможны кратковременные зуд и жжение, отек ткани.

Аллергические реакции при индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка:

При неправильном применении препарата возможно образование эрозий. С целью предотвращения кислотного ожога препарат необходимо смыть проточной водой. Заживление может происходить самостоятельно без применения дополнительных лекарственных средств или с использованием ранозаживляющих препаратов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие препарата Мардил Цинк с другими лекарственными препаратами местного действия не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Обращаться с осторожностью. Перед вскрытием флакон следует встряхнуть и переместить раствор, попавший в верхнюю часть флакона, на его дно.

Вскрытый флакон должен находиться в строго вертикальном положении.

Мардил Цинк содержит в своем составе кислоту. Следует избегать попадания препарата на здоровую кожу или слизистую. Если произошло случайное попадание препарата Мардил Цинк на здоровую кожу или слизистую, необходимо как можно быстрее удалить препарат при помощи смоченного
водой ватного тампона.

Если произошло случайное попадание препарата в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством воды и 1%
раствором гидрокарбоната натрия, а затем обратиться к врачу.

После проведения лечебных манипуляций возможно проведение гигиенических процедур. Однако следует избегать посещения бассейна, бани, сауны, купания в открытых водоемах, принятия ванн.

Перед тем как выбросить флакон, следует остатки препарата смыть в проточной воде. Пустой флакон можно выбросить в контейнер для мусора.

Применение в детском возрасте

Противопоказан пациентам в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять лекарственное средство по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mardil_Cink