

[Марены красильной экстракт \(таблетки\)](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Марены красильной корневищ с корнями экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки** от светло-коричневого до коричневого цвета, с более темными или более светлыми вкраплениями, двояковыпуклые, с риской.

	1 таб.
Сухой экстракт корневищ с корнями марены красильной	250 мг

Вспомогательные вещества: лактоза (сахар молочный), крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный (аэросил А-380), кальция стеарат, кроскармеллоза натрия.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Спазмолитическое средство растительного происхождения. Основным действующим веществом препарата является марены красильной экстракт сухой, получаемый из корневищ и корней марены красильной – *Rubia tinctorum* L. и ее грузинской разновидности *Rubia tinctorum* L. var. *iberica* Fisch. ex DC. (*R.iberica* Fisch. ex DC.) Koch сем. мареновые – Rubiaceae.

Экстракт марены красильной сухой обладает диуретическим и спазмолитическим действием, способствует разрыхлению мочевых конкрементов, содержащих фосфаты кальция и магния и их выведению из почек и мочевыводящих путей.

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (ЕМЕАНMPWG11/99) при проведении клинических исследований препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания к применению:

— мочекаменная болезнь у взрослых - для уменьшения спазмов и облегчения отхождения мелких камней и песка.

Относится к болезням:

- [Мочекаменная болезнь](#)
- [Спазмы](#)

Противопоказания:

- острый и хронический гломерулонефрит;
- выраженная почечная недостаточность;
- язвенная болезнь желудка;
- непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или мальабсорбция глюкозы-галактозы;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 таб. 3 раза/сут. При необходимости доза может быть увеличена до 2-3 таб. 3 раза/сут. Таблетки перед приемом следует растворить в 1/2 стакана теплой воды.

Курс лечения составляет 20-30 дней. Проведение повторного курса лечения возможно через 4-6 недель после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

При применении препаратов марены красильной моча окрашивается в красноватый цвет; при резком окрашивании мочи в буро-красный цвет необходимо уменьшить дозу или временно прервать курс лечения.

Передозировка:

Передозировка препаратов марены красильной может вызвать боли, связанные с отхождением конкрементов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата Марены красильной экстракт не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о взаимодействии препарата Марены красильной экстракт не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при остром и хроническом гломерулонефрите, при выраженной почечной недостаточности.

Марены красильной экстракт (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 15°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mareny_krasilnoy_ekstrakt_tabletki