Марены красильной экстракт (таблетки)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Марены красильной корневищ с корнями экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** от светло-коричневого до коричневого цвета, с более темными или более светлыми вкраплениями, двояковыпуклые, с риской.

	1 таб.
сухой экстракт корневищ с корнями марены красильной	250 мг

Вспомогательные вещества: лактоза (сахар молочный), крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный (аэросил А-380), кальция стеарат, кроскармеллоза натрия.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Спазмолитическое средство растительного происхождения. Основным действующим веществом препарата является марены красильной экстракт сухой, получаемый из корневищ и корней марены красильной – Rubia tinctorum L. и ее грузинской разновидности Rubia tinctorum L. var.iberica Fisch. Ex DC. (R.iberica Fisch. ex DC.) Koch сем. мареновые – Rubiaceae.

Экстракт марены красильной сухой обладает диуретическим и спазмолитическим действием, способствует разрыхлению мочевых конкрементов, содержащих фосфаты кальция и магния и их выведению из почек и мочевыводящих путей.

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (EMEAHMPWG11/99) при проведении клинических исследований препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания к применению:

— мочекаменная болезнь у взрослых - для уменьшения спазмов и облегчения отхождения мелких камней и песка.

Относится к болезням:

- Мочекаменная болезнь
- Спазмы

Противопоказания:

— острый и хронический гломерулонефрит;

— выраженная почечная недостаточность;

— язвенная болезнь желудка;

— непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или мальабсорбция глюкозы-галактозы;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 таб. 3 раза/сут. При необходимости доза может быть увеличена до 2-3 таб. 3 раза/сут. Таблетки перед приемом следует растворить в 1/2 стакана теплой воды.

Курс лечения составляет 20-30 дней. Проведение повторного курса лечения возможно через 4-6 недель после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

При применении препаратов марены красильной моча окрашивается в красноватый цвет; при резком окрашивании мочи в буро-красный цвет необходимо уменьшить дозу или временно прервать курс лечения.

Передозировка:

Передозировка препаратов марены красильной может вызвать боли, связанные с отхождением конкрементов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата Марены красильной экстракт не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о взаимодействии препарата Марены красильной экстракт не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при остром и хроническом гломерулонефрите, при выраженной почечной недостаточности.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 15°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mareny_krasilnoy_ekstrakt_tabletki